

西藥畧釋


卷四

4

4

B. Chinese

Vol. IV.



平脈平腦論

凡脈頻數及腦不安均能致痛此平脈平腦之劑所由設也

顧脈之數有數端一因身熱而致一因心之下左房肉生

厚及其房門有壞而致一因心房生大而令房外之肉軟薄

而致一因血流過多而致一因久病血薄而致是皆能

令脈急促而貴有以平之也惟欲平其脈須先療其症症既

治而脈乃可平也大抵平脈之藥亦多而要以毛地黃匪罈

稔二藥爲最此則不論有症無症而胥能平脈也乃有時平

脈之劑亦能平腦而平腦之劑亦能平脈是豈必區區致辨哉

惟二者雖頗相通而或則平脈之功居多或則平腦之功居多

故聊分其類耳。若夫平腦之藥亦不一如草烏頭與白匪罈
稔則能治身中骨痛及腦筋痛也如謙落則能療胃不消化及
大小腸久失功用也如菸葉與路卑利則能令沉悶昏倦及肉
筋無力而用以續骨鉸等症也是知平腦之藥實與平脈之藥
同重而缺一不可矣。至於並行不悖而脈與腦均能平者則
惟輕炭淡酸及雪水二物而始有此妙用也已。

謙落

西名高尼亞

此樹產歐洲美國等處高三尺其臭恍若麝香

采葉及果核入藥用覈取葉與果核內皆函有精液可用

法取出形色其精液能過光而比水還輕色黃似油

氣味味辣臭似菸葉

功用平腦脊髓及自和腦根並可止痛

服法若以葉研末作散每次宜服五釐六釐用作藥膏每次宜

服三釐四釐

外治皮膚各症宜以此膏調水擦之

論訂惟性甚酷毒而且所製之藥其功力或輕或重殊不足

靠故醫家鮮用

洋茉莉

又名遮司味

藤本蔓生，沿高樹旁過別枝，產美國南邊，春月

開黃花，瓣長寸許，氣甚香，採根入藥用，又可作藥酒。

功用

平脊髓及自和腦根，減少心之發力，故能止腦筋作痛。

主治

乾咳過甚，不拘老幼服之見效。婦人行經，覺身體不

安者，服之甚效。

亞匿加

產歐洲，亞細亞洲北邊，樹約高八九寸，采花及根入

藥用

形色

根約長二寸，厚不及一分，外皮深棕色，內層白

色，中心黃色，氣味

功用

平腦脊髓，平心脈。

相反

輕淡水 火酒 鴉片酒 樟腦

相佐 藜蘆 毛地黃 草烏頭

方劑

一方 大熱症熱盛時可減心脈之數疾

亞匿加根二錢 相末 清水九安 土 煎至賸六安士爲度

每服一酒杯每兩點鐘一服

又藥酒方 亞匿加根八錢 相末 火酒二十 安士 浸兩日隔淨隔時

加些火酒得回二十安士爲度每服一錢至二錢

主治 大熱症退熱未盡時日久身弱服之甚效 每服

五滴和水飲之每三四點鐘一服 顛狂將作心內煩躁異

常服此甚效 飲酒醉甚狂妄不知兇險者服之亦效

風溼症日久不愈者服之可愈 走風腳亦可治 凡跌

撲打傷骨痛、外皮未損破者、用此藥酒搓之甚效、西國以此爲治風溼跌打通行之方也、

帶微搭連

此藥以各等花、加魚肝油、或加牲畜骨油、或加雀

屎、或加浸鹹魚之水、蒸製而成、

形色

清稀無色、有輕淡在內、其氣能焚、

氣味

臭似鹹魚

水

溶化

水能化、火酒亦能化、

功用

平腦、平脈能減少心脈之發力、故能令身熱略減、

主治

風溼骨鉸腫痛、

服法

每服四滴至八滴、以水和化、

配合

此水合綠氣可成鹽類、名綠氣鹽、每服

三四

釐、每三點鐘

一服

乍波蘭吻

出產製法氣味功用俱詳卷發表門內茲再列

入平脊髓門內以便臨症查閱云

加喇巴豆

加喇巴在亞非利加之西而此豆產於其地故因

以命名也其莢長約^五寸內函豆^三粒每粒長約八分濶約五

分

考訂

用以作藥其性甚毒

辨謬

彼土人嘗以此試驗淑慝謂服之立斃者即爲罪人服

而不死者乃非罪人蓋謬論也而實因其性酷毒過服則

必傷生耳

功用

平腦平脈療眼症用以縮小瞳人

服法

研末每服一釐半若作藥膏每一釐宜調水分作十服

外治

眼科用以外塗或將膏開水滴入眼內均能令眸子縮

小此與了刀邊能令眸子散大者實相反也

是療眼之法荷多或用細或用樹膠作薄片均藥

水候乾貼入睫裏其妙其法詳上刀邊篇

凡服了刀邊及顛茄過多又宜用此藥解之

亞司連

即加喇巴豆之精 功助主治皆同不復再述

菸葉

原產美國後各國均有植焉此葉內面有液用法取出

西國呼爲尼哥顛者即此物也

形色

其液無色過光露天氣則漸變黃

氣味

味甚辣性

甚毒

考覈

大約乾葉每百分多則能提出該液六分或八分少則

能提出三分或二分 此物若與酸品相合則可製成鹽類

溶化 伊打火酒能化而水與油亦能化

功用 頗能平腦平脈

主治 猝然抽搐牙關緊閉些虛西名鐵子利即燃此葉用法令煙納入糞

門但此法宜覺之弱者勿用誠以此法其陰未可妄用也一法以葉泡水用水節射入大腸或將

所泡之 waters 外敷亦妙此則能令肉筋寬鬆也 氣喘令吸其煙亦可略止 服士的尼過多者服此可解之

方劑 作藥水方

乾菸葉三分半 沸水十八安土量 浸一點鐘濾淨彼大便艱

澀者宜以此水用法射入肛門但須先射一半如歷半點鐘不驗則再將一半射入可也蓋以葉泡水射入肛門其有用至五分而能傷入者故凡用此法應當宜用葉三分生或三分便定

藥酒方

乾菸葉 八錢

車釐酒 十六安
土量

浸七日濾淨每服十滴

至三十滴

論列

此物氣芳通腦生津故世俗取其葉而製爲各色菸品

迄今各國靡不尙焉抑知燃其葉而吸其烟實多貽害試觀蝕斯葉者除菸蟲外更無別物是可知其酷毒矣大抵初吸其煙雖些少亦覺悶若吸過多則頭昏面白脈沈身軟手足覺冷呼吸覺慢或作嘔或發顫甚至或有昏迷欲絕之狀其在吸食已慣者將必菸癮頻作然或間斷略久頓覺頭腦不安迨吸煙既久則菸癮彌深將見病

端迭起，輕則恒覺胃不化而心不安，重則令目之腦筋變壞而間或失明，此蓋因於毒由漸入腦，而日積月累，故不免壞人也。

路卑利 出處形色功力製用俱詳上文吐藥篇內，茲特再列入平腦門，以便查閱。

輕炭淡酸

即西名威度德恩弱酸

製法

用鈹鐵炭，加入磺強水及清水，甌

製而成

是皆桃李二樹其花與仁均固有此藥質亦宜知也

又法

用銀炭淡

八分半

輕綠酸

六分

九釐

雨水

一安士量

同入黑罇和勻

緣此藥水不能見光，故用黑罇存貯，或用黑紙封密亦可。

此藥水之淡

者也，用以療症甚合。

蓋療症宜淡不宜濃，蓋因藥性酷毒故也。大約此水每一百分而該藥只值三分而已。

功用

平脈止痛

主治

筋抽

服法

每服二滴，日服三

三

西藥畧釋

卷四

平谷髓及自和腦筋

輕炭淡酸

六

次加水調服 但此藥水毒極並不能久貯故醫家鮮用

銀炭淡

西客西了泥

製法

用銀鐵炭淡及銀炭養和勻入鍋燂熔將

見上浮者即銀炭淡而下墜者即鐵養也由是取出銀炭淡而棄去鐵養俟冷凝為實物貯入玻璃樽

形色

其色白儼如磁塊

氣味

其臭恍若桃仁

彼映相家極用此藥

功用

功同輕炭淡酸

服法

每一釐宜分五服

方劑

一方 外治頭痛

銀炭淡

三釐或五釐

清水

一安士量

調化布蘸此水敷之甚效

他如被銀炭養其指而以此水滌之即除

惟藥性毒甚若以

三釐

飼犬則立斃醫者宜

慎用也

亞咪咧淡養 製法 亞咪力火酒一份 淡養酸一份 同

入一大玻璃樽略燂熟然後甑之用法收取再行製淨乃可用

形色 色淡黃恍同伊打酒或云略似油能飛

氣味 別具一種氣息 溶化 水不能化火酒能化

功用 專屬脈管故行血氣能令心跳速逾平時而在脈管之

腦筋反令力緩故云平腦即平脈管內之腦筋也

用法 凡療症每用兩滴至五滴洒在手巾內鼻吸其氣乃可

此物毒甚切勿多用

主治 羊弔症將起時以此藥聞之可止 婦人頭痛面色變

白者聞三滴即止 氣喘症因腦部不安者 鎖喉症及

抽筋者，心痛垂危，以致肺部悽苦難堪者，聞之均止。但初聞之際，病人面色通紅，有覺危險者，有不覺者，但總宜小心慎用，逐少試之，庶獲萬全之效。

草烏頭

中國西國皆有，該樹高尺六至五尺，而根則頭大而末削，及多橫蘊，長約四寸，根色外棕內白，入藥則取其根與葉用，但根之功力比葉尤峻，故釀作藥酒者，或根或葉亦須聲明。

考訂

查時珍本草言烏頭辛溫大毒，各方主治大風頑痺風溼癱瘓頭風等症，而不知其有平腦之功也。西醫用化學釀明，內函蛤利之味，即草烏頭之霜，西名厄哥匿顛者是也。

質類鴉片之麻啡，惟不易製耳。

辨別

其在鮮葉味苦而辛嗅之令人欲睡若以葉含數刻其喉舌始則刺而木繼則腫而熱其在乾葉則服後略久而始有此徵惟葉既陳則不堪用也 根作泥氣入口則先覺甜而後覺苦辣此藥自古原人毒品人所鮮服而用作服劑者僅百年耳

服驗

以根少許入口即能發涎唇舌間覺有針刺服後則能平腦而令遍體腦筋麻木不寧四肢如觸叢針肉筋亦隨減力若服稍多則必致渙而無力眼簾收縮又其甚者或服至壞人之分而則尤覺喉刺熱腹痛甚作渴作吐作瀉通身麻木而愈形軟弱惟終不至昏蒙抽搐耳 火酒浸

之能提出其功力故尋常用者多以此所浸之酒入藥

內服藥酒方

草烏根

一兩四錢
研粗末

淡火酒

二十安
土量

先將火

酒十五安土浸此根末兩日隨用一漏斗插入罇口卽將

該酒連藥倒在漏斗令其流進罇內其餘火酒尙有五安

土亦用以漂淋至藥滓則仍須揀出餘酒然後濾淨由是

再加入淡火酒以共得二十安土爲度此酒酷毒凡內

服者務宜小心每服五滴至十滴每日三服

服法 首

一日每次服五滴第二日每次服六滴嗣後每日每服均

加一滴最多者每次服十滴爲率倘服至四肢覺有頑木

卽宜暫停待此徵過盡之後方可再服也至若服後而身

大寒正熱盛時寸脈
疾服此雖覺平
究不能使其熱速退
也醫者不可不知

血囊

驟弱或氣喘或脈過慢應即停止勿服蓋此藥服後能令脈沈也

外治藥酒方 草烏頭一觔 樟腦八錢 法以淡火酒和藥

先浸七日隨以紙濾隔至乾復加火酒漂淋以共濾得十

六安士為度凡外皮用以擦療者均以此酒為上品惟忌內服

主治 腦氣筋痛或服飲劑或以外治之酒頻擦甚驗 牙部

腦筋作痛宜先用酒外擦腮頰俟數日未愈方可內服又

牙痛即以綿蘸藥酒塞入牙穴而痛即止 初患風溼每

日宜服此藥三次連服數日可愈若舊症骨衣生厚亦宜

日服飲劑三次兼擦外治藥酒 跌打損傷用酒外擦奇

效 胃不消化及舌有白苔宜與瀉藥或表藥同服

方論

西醫以草烏根作酒，嘗有比尋常分兩加至六倍，而內服仍每次用五滴者，蓋準此療治，而自能獲效。誠以用藥稍多，便不穩妥，故往往多用平淡之劑耳。然使服平淡者，久不見效，則又應改服濃劑也。

白藜蘆

西名白匪蘆稔

此樹高三尺，歐洲中國俱有，而入藥則用其根。

形色

根大如指，色白。

氣味

嗅之，令人掩鼻，惟乾者無

臭，厥味則乍覺甜，而漸覺苦辣。

考覈

根內面有霜，用法取出其霜，甚毒。西醫所謂匪蘆地丁

者，卽此物也。

功用

平腦 服法 每一釐須分四十服 若以根研末，嗅

之能令嚏噴

或用以辟
蝨亦可

且內服藥末並能令吐瀉

惟

此藥酷毒異常醫者鮮用

青藜蘆

西名青
匪錦稔

出產美國中土樹之枝幹形狀與白藜蘆同唯

白者產於岡陵青者產於澤畔耳

氣味

功用

擦外皮立見紅熱其霜嗅之令人嚏噴不休內服則嘔

吐大作

間有服後作瀉者

其平脈甚速服少許俟兩

點鐘再服可使脈弦數者轉為遲緩 比如平人試之服

後可減少平日至數三分之一或甚至減少一半不等可

見其能銷弱心脈之力故各脈管亦因之無力也

宜忌

此藥性力過烈吐後億弱難當故不列入吐藥之用

主治

凡心跳症或因吸生熟烟飲濃咖啡而致者服此可止

心肌肉生厚跳動逾常有力者服此可減緩略安胸心膈膺

腦部肺肝各臟腑積血多尚未發炎之先服此藥能免其

成炎亦可佐別法以散其積血既發炎則不宜服 跳血用此藥以減少心力跳動兼外治療之

外治

比如患在何處或夾東以壓止之或用拇指摘緊或用

線綁紮如是則可令血囊內之血易於凝結漸就見效也

方劑

一方 藜蘆酒

青藜蘆十六安士用 美國斤兩

火酒備足

先將藜蘆搗成粗末以火酒四安士浸透入漏斗漸加火

酒至收足三十二安士為度 每服五六滴每三點鐘一

服服至作悶或服至寸脈已緩則減少服之或停服比
如放血或瀉劑欲減輕其血脈急迫之患者此藥皆足以
佐之

相反

燒酒

鴉片

輕淡水

倘誤服此藥過多卽用鴉片

等服而解之便可

相佐

草烏頭酒

路卑利酒

冰水

凡以冰水療症功能平脈及可去炎或用冷水代之亦

可

主治

週身發熱卽以布蘸冰水鋪之而熱可略散頭

腦積血作痛及身上或有腫痛亦以布蘸冰水敷之自可

散血止痛消腫

如被湯火所傷卽照上法敷之亦驗

此症

須敷頭項
冰方能獲效

如大腸及胃發炎宜飲冰水並用水節納水射

入肛門

如月經過多即用冰水一盤橫搭以板令坐其

上將見冷氣透入而經水自止

如遇割症先以冰置割

處片時而後割之則痛可略減

已上各症均宜療以冰

水惟臟腑發炎者忌用

冷水

功用與冰水同

外用

以冷水浴身先覺涼後覺暖則其能行氣血可知矣

跌打損傷宜以布蘸冷水敷之能散血止痛

扭傷骨絞

宜用冷水浸

三點鐘並敷以溼布

刀傷鎗傷等症即

以溼布敷之庶免積血發炎

腹內熱痛用布帶蘸水纏之

外加乾布擁護，若療大熱症，其法有三：一以冷水抹

身

此一法隨時可用

一以冷水淋身

一以衾蘸水覆蓋全身外加

衣被護衛

此二法須用時

令冷氣透入臟腑，俟歷二點鐘，並飲些

冷水方能散血退熱

以上敷法，悉宜頻頻換水，庶易奏

效

檸檬酸

此物乃用檸汁製煉而成者也

形色

作珠無色

性味

性涼味酸

溶化

冷水易化

功用

止渴消炎

主治

凡身熱作悶及胃發炎，卽以檸檬酸調水飲之，立效。有

一症，西名士加呢者，而服此尤妙。

蓋該症牙肉腫痛，及口爛，脾多由久居船中，多食鹹物太過所致也。故西人行船必多備

檸檬汁等物

方劑

一方

鈹炭養一錢

清水四安土量

和勻，即將此水

一錢，加入檸檬汁四錢內服，能止渴退熱發表。

又方

梔珠二分八釐

鎬炭養三分四釐

即用二杯各貯一藥，以水調

化，然後彼此和勻，令作沸狀，隨卽飲之，亦驗。

解毒殺微細生物藥論

陽長陰消造化具循環之理，秋霜春露，上主顯生殺之權，祛害物之物以保全生物，除害人之物以顧惜吾人，無非欲盡人之性以盡物之性而已也。西國醫生近年救世心切，格物功深，不僅化製金石以拯瘡瘍，兼且洞達細微以防隱患，用顯微寶鏡以察受病之肌膚，使伏蠱無不昭然，即目力不及見者亦可得見。特創解毒殺蟲之品，詳列方論，其微細蟲有數種，或膿瘡臭爛而生，或膀胱內變壞臭穢而發。又考釀造酒令其發變成醋者，以顯微鏡細察，有微細草類在內。一發霉衣物之處亦然。一皮膚之間發變，或生微細蟲，或微細草類不等。一喉

內生假皮之症亦有微細蟲在內，於是西醫用心研究，何藥可以除殺此等患害，故譯錄以示後學。夫患每忽於隱微，禍終成於糜爛，可不慎歟！人又何可自矜察察之明，徒治其可見之患而不究人所不及見之暗毒可乎？是在知微知著之君子。

養氣

製取之法

用錳養

即黑蒙散

銀綠養

各等分

二味分焙乾入堅玻筒

或銅罐

下以酒火燻之

銅罐則用炭燻

筒末通連

玻管管末過水接以別罐可以收存待用

餘法詳化學初學意內

無色無臭無

味

溶化

水或火酒能化少許

功用

天氣中每五分淡氣居四養氣居一人晝晝夜呼吸皆

賴此氣以養生命功用極大凡肺氣管痰多及哮喘不

能接納天氣如常者或曾吸毒氣入肺者或嗅蒙藥太過

危殆者以上各等阻吸養氣之患用淨養氣一味設法導

進以治之婦人血薄病後血弱紅輪減少可聞養氣兼

服鐵劑甚效

症屬重則用淨養氣症略輕者可用養氣

一分和入天氣二分或三分以用之亦可

相合

此質與各質能相合而成各等藥類

變化

但經電氣或以燐質在溼天氣時能變為阿純

詳化驗略
暗自含奇

阿純

味如硫黃辟穢力甚偉禽獸肉經腐穢者置阿純瓶中

穢氣頓革力大於原養氣如以銀薄投阿純瓶中阿純立
食銀薄而為散金類亦然 碘已與金類相合者遇阿純

碘即食金而驅出按阿顛原養氣亦無是力也 阿純瓶

加熱逾沸水之度其阿純還原為養氣天氣由外洋吹至

者內有阿純若雷電之際地面風內亦必有阿純不可不

知

綠氣 製取之法

黑蒙散

四錢

輕綠酸

二兩 四錢

清水

廿四 安士

先以黑蒙散

四錢

入一玻瓶，再將清水兩安，加入輕綠酸內，和

勻，同入玻瓶，慢火燂熱，瓶頂連曲玻管一支，接入別玻瓶，內貯清水

兩安俟綠氣由玻管直透至瓶底，於是另一玻管並列瓶口之右

運綠氣轉過倒接一可承六十四安水之大玻瓶，瓶內預放清水二十安士

其玻管亦直透至大瓶底，此瓶除水外，可收綠氣甚多，共用玻

瓶三個，第二個瓶口塞密，第三個大玻瓶瓶口只用綿花封之，

取其可通進天氣，察看大瓶內收滿綠氣時，取去玻管綿花，以

玻極塞緊，撤令極勻，隨卽放開玻極，收入天氣，又塞回，再撤勻

再放開如是者^五次不等則綠氣全被清水食盡遂成爲綠氣水矣貯以恰盛二十安士之樽塞密樽口放在黑暗之處方免變壞凡製取綠氣之時最宜謹慎勿被其氣入人口鼻爲要且能壞各等顏色

功用

解毒解穢洗潰爛毒瘡腐肉最效

內服解毒用一錢

至四錢須以清水開淡方可

治諸般瘡毒服之致壞心之懷也

凡喉嚨痛爛用

五滴至十滴清水兩安士開之用樹膠永節逼其汽射入

喉內甚效

一 方 治喉症爛痛或口內糜爛

綠氣水

四錢

清水

三安

糖水

四錢

每日含漱數次自愈但慎勿吞嚥

溴質

此物用鹽鹵製成。形色 屬流質能化氣飛去須密

罐收貯水色深棕紅其升散之烟色橙黃。氣味 味與

綠氣碘質頗同而臭惡過之 能壞各等物之顏色蝕入

木則能腐木

溶化

水三十三份能化一火酒伊打酒二十餘份能化一

受熱至百度表之六十三分則沸而漸化氣冷至百度表
之下二十三分則凝結如冰

功用

解毒凡瘡潰日久有死肉處或好吵癰用淨溴質以木
條蘸綿花蘸藥搽之但搽處痛甚故少人用搽疔每藥一

錢須開清水七錢乃可 又可製成銀溴詳見下文

方劑 一方 治傷風初起鼻內皮爛久臭穢聞之可解

溴質三十滴 火酒四安 和勻 每用一錢以小盞手握

漸暖就鼻聞之 又有暑月園林濃茂有不好花草氣息

吸入鼻致患喘逆者聞此自可解散而愈

加搗醃 此物係由煤炭氣所賸之油而用法製成者也

形色 一屬水其色棕黑而面有雜質 一屬冰其色清白而

結珠形二者行血之功同 **氣味** 濃者入口涼甜後辣

熱淡者入口清涼後溫暖

收藏 藥珠宜用玻璃貯密露置則發潮而漸化

溶化 水百分能溶化三分甘油伊打火酒化之甚易 若受

熱至九十五分或用樟腦少許則變為流質而如油之稠

功用 淡者能行血氣濃者具有丹力能打爛皮肉搽在外皮生覺熱同火灼初搽處發熱

自後則變為棕色該處不知痛痒刀刺不覺甚敷人極多能入血裏
人倘誤服入胃內皮情與外皮同誤服生安至一安均能受 能殺目看不見之微細

生物比如醉水發熱癩癧發熱或潮濕衣物發熱用藥微發熱
之則見有微細之生物在其間即生癩癧發熱具象然

用法 加播匿酸一分水九十九分和勻或加入酵糊或酒刷

衣物或搽洗膿瘡可辟除此等微細生物免其發變

主治 久患皮膚癬疥有蟻蟲在胯間陰處作痒不休開淡頻

頻擦洗自可斷根

服驗 此藥服後先入血之據一由內腎隔出小便略黑起烟

一由肺內皮亦有隔出氣味

辟穢

淡者可辟除病房毒穢之氣且用以浸肉久而不腐

濃者若放入尿裏則該尿亦久而不變

方劑

一方 止悶嘔胃內腦筋不舒

加播匿酸珠

六釐八

鉍養散

二錢

樹膠水

一安士

樟腦

水

三安士量

每服四錢每兩點鐘或三點鐘一服

或初起

嘔瀉

胃內積腐呃逆臭惡等症皆效

一方 止霍亂

加播匿酸珠

六釐八

碘酒

十六滴

樟腦水

四安士

和勻每服四錢每兩點鐘一服

一方 孕婦作嘔

加播匿酸珠 一分 清水 半安 和化每服二三十滴加

水調服日服二三次可止 又一方將此藥水一分和清

水九十九分貯入小盅內以手握暖令其藥氣上升或用

樹膠水節袋鼓動其氣升騰均可或加碘酒數滴亦妙

一鼻內皮發舊炎流濁涕腥臭者照此法治之 一肺內

皮舊炎亦可用上法治之 一因吸入花草不正之氣味

致氣喘者照法治之

一方 貼毒瘡 播匿酸珠 八釐 錐養膏 八錢 和勻紗

紙開勻貼之 又方 播匿酸珠 八錢 甘油 四安 和

西藥畧釋 二六 解毒門 加播匿酸

化搽皮膚各症甚效。腐瘡有深穴，以布條蘸藥水插入穴內，能祛臭去毒。膿瘡搽之，能令膿水不臭，並能令血氣流行，而瘡口易收。凡耳鼻口喉之內，及前後陰等處，或有臭氣，用此藥水開淡洗之，自可辟除。他如屋有白蟻，將此藥水洒在該處，亦可屏絕。

又方 老人皮膚白屑作痒效

播匿酸珠

二錢

甘油

八錢

清水

六兩
四錢

開勻搽之

一方 皮膚癬疥甚效

播匿酸珠

一錢

甘油

八錢

和勻搽之

一方 寒天腳生蘿白

播匿酸珠 一錢

碘酒 二錢

炭匿酸 二錢

白藥膏 四

錢 和勻作藥膏搽之

作丹用

凡男婦因疔毒前後陰等處生小蕊出惡水用濃加

播匿酸冬月須燂化塗之搽時以玻條搽之或用木條搽

之片响拭去以花士玲貼之每兩三日搽一次 奸吵毒

瘡輕症者亦可用此治之 几惡毒爛瘡或割肉瘤傷口

略開濃些亦可

幾阿蘇

此藥水係用木甌製而成者也

形色

該水似油甚清亦有色黑者

氣味

氣息恍如焚木發出之煙味頗辣入口能令肉爛若入服劑

宜加水
冲服

溶化

水能化少許火酒伊打能化

功用

行血頗同加播匿酸

方劑

一方 幾阿蘇 一滴 清水 一盅 和勻

凡嘔吐飲服可止 腐瘡或頸癰塗之效 爛牙痛甚以
棉花蘸藥水塞之可止 和炭匿酸或和鴉片少許亦可

一

方 治皮膚各症

幾阿蘇

一錢

白藥膏

八錢

和勻搽之甚妙

一

方 聞嗅其氣可治肺內皮新舊炎症並可辟口鼻呼吸

臭穢

幾阿蘇十滴或二十滴和滾水一盅 乘熱吸其氣入肺

沙泐先酸 一形色 此藥結珠形如小針嘴 氣味 味淡易

服若試以冷水則藥味全失

溶化 濃酒與伊打酒熱水均可化冷水不能化 鎢磷養三

分和水五十分可化此藥一分 硼養化之甚易硼酸同

此質性故用之尤相宜以硼砂八分和水一百分可化此

藥三分 先將硼砂溶化漸加此藥
冷時必有此須未化之滓

功用 內服發表性平無毒療瘡則有淨膿去腐殺蠱斂口之

功勝於加播置酒內放人少許日
久不變免生蟲牙粉內亦不可少

服法 可服一分七釐至一錢惟用水開則紫紅味重難服

相反

蛤利類

故兼用蛤利類則失解毒之力

相佐

加播匿酸

硼砂酸

安息酸

方論

按用此藥不利小便亦無發嘔

當有服至三分四釐至五釐者

惟鎬沙泐仙

鹽功功仙蘇并治風摩功用與沙泐仙全

大服則致悶嘔耳

作鹽類則無解毒之

力論退熱則平人服之如常熱病者晚間服一錢至錢半

汗出能減寒暑表兩三度之熱脈數者亦漸平和藥力可

退熱一日隔日應再服

論治腦病與金雞納霜同亦能

治困倦頭痛耳鳴等事

論理胃解胃酸嘔有穢味者殺

腸蟲凡大熱症生血蛇

商名衣哩昔拉士

風溼新症肺本體發炎內

傷瘧疾皆可用以退其身熱喉發炎生假皮可內服亦可

外洗 論減身熱有兩等有血經受病大熱與一處發熱之身熱不同此藥能治血病大熱與割症後發熱最宜論風溼新症以此爲最效之品

一方 沙朥仙酸一分七釐每點鐘一服連服十二次或至三十六次照此服法一兩日內痛止病苦亦減

外治 一方 沙朥仙酸 硼砂 開水洗身可辟汗臭

凡頭面生水螻癩擦洗俱效瘡癰流膿水太多可止治疔毒雖不及加播匿酸而加播匿酸味重難聞殺螻不如此藥之妙療毒癰腐爛肌肉及割後傷口可製散摻之或用此藥水洗之或製膏藥以貼之亦妙

膏藥方

沙朥仙酸

五分至一錢

白蠟

一錢

吧喇啡

二錢

杏

仁油

二錢

等味入鍋攪勻至熔以布開之

又方

鯨魚油

錢半

茄油

五錢半

沙朥仙酸

五分至一錢

各等入鍋攪勻至溶以布或紙開之

又方

沙朥仙酸

一錢

生油

八安

入鍋攪勻以布或紙

開之療湯火灼傷立效

癰疽爛肉割口傷及一切瘡

疥皆可治之

又方

凡膀胱發炎尿臭用沙朥仙酸或沙朥仙酸蘇打節

射入膀胱可解

硼砂

化學覈出其質乃鑷硼養加水也

形色

色白半過光形類珠或作三角珠形或作八面珠形若夜間將兩珠互擦輒生光亮惟用火烘去所函之水乃變爲枯硼砂也

氣味

味始則略甜繼則略鹹而苦

溶化

冷水十二倍方能化一煖水兩倍即能化一大抵用硼砂五釐而以樹膠水一兩浸之即能令溶化爲膏且鉅葡酸散徒以水不能化惟將硼砂加入方能化也

功用

內服與鎬養蛤利同

服法

須量孩子之大小用之自五釐至分半沸水調服大人服此藥每次一分至五分

主治

婦人臨盆服此藥能令子宮發力 小兒口爛並生白

點宜外搽內服

外治

蘿蔔症此症生於各處北方尤多用硼砂二錢 豬油八錢 和研塗上 金

錢癰用硼砂一錢 白醋兩安土量和搽 潰爛瘡宜塗以硼砂

水 小兒口爛外用硼砂末及冰糖或蜜各等分研勻

塗之 療口瘡及皮膚癰症用硼砂末八錢 甘油五安土量和

塗 婦人白帶用硼砂末二分 清水三安土量和化 用水節射

入 陰戶發痒用硼砂四錢 礬強磨一分 清水八安土量和

勻搽之可止 且覺發癢無論男女婦亦宜照此塗之

嬰兒吮乳而致乳頭爛者用硼砂末調水搽之或和甘油

搽之均妙

辨謬

至本草綱目誇其能消痰止嗽破癥結喉痺生津液去口氣除噎膈消障翳而且反胃積塊結瘀骨哽及口齒諸病均能療治然究無實據亦概屬浮詞耳

硼養酸

製法

用硼砂以滾水化之加入輕綠酸結珠洗淨

焙乾卽硼養酸也

形色

色白返光

氣味

淡帶微辛

溶化

冷水三十分能化一滾水三分能化一火酒能化伊打

酒不能化

功用

去臭殺除微細生物止發霉腐變搽爛瘡止膿與加搽

同

主治

打傷割毒癰傷口用此藥水洗之解毒

去微細生物免其發膿西國割症後所用藥傷口之通布係用明藥凡瘡水蠍

癩滾水傷皮膚作痒肛門作痒用以或搽或洗均效又

熱症中有喉内生假皮者以新筆蘸藥水搽之能殺假皮

之細蟲小兒亦可用照冷水三十分化藥一分用之便無

損礙喉內矣

永綠毒藥 製法

汞磺養十六兩 鎬綠十二兩

後相和再加入錳養散八錢同入乳鉢研至極勻方妥由是用

法甌之將見有升騰於上而結白珠者此即永綠毒藥也

功用 作改病藥 服法 每一釐宜分十次服 去花柳疔

毒殺微細蟲及生物

慎用

蓋此藥毒甚，服之慎毋過多。倘遽服至^二釐，將見腹胃發炎，而輒多損害。或服至^四釐，則將受毒愈深，而尤恐傷生。彼誤服此藥者，即喫生雞蛋白以解之。

藥水方

汞綠毒藥 八釐

輻淡綠 八釐

清水 四十安士量

調化照此製法，則是藥水。每五安士，即含有汞綠毒藥一釐也。此藥水能療日久疔毒、及魚鱗癬、蛇皮癬、水蠱癩等症。每次宜服半安士，日服^三次，但須久服，方有功效。若偶服之無濟也。此藥原與迦路米、汞藍九同功，而西土

名醫則以爲服此更勝云。此藥甚毒，故能殺蟲及生物。然須藥一分，開水一千五百分，或二千分之多，照計則藥一釐，可開水兩安士。

外治

各患處有微細生物，以致發膿成毒，其腐痒痛者，或搽或溼布敷之，均可。新割毒癰、傷口、產婦內損、喉內起假皮等症，用此可代加播匿酸、沙朥仙酸、硼養酸之功效，但宜加意慎用，切勿過濃過多可也。

安息酸

安息香出處形色製法氣味功用已詳上文卷化

痰第 篇內矣，茲論安息酸詳列於下

功用

解毒去臭，止腐膿，除微細生物，洗蟻癩，與及割症新傷

口用此與沙泐仙酸礪養酸功力相同

方劑

一 方 治膀胱內皮發炎溺有積滯

安息酸 一分

輕煖炭養 一分

沸水 八錢

和勻服之

去毒藥酒方

安息酸

一兩六錢粗末

鴉羅膏

三錢粗末

士都勒

一兩二錢

到嚕漿

四錢

火酒 二十安士

和勻以火酒浸七日用紙隔淨隔時

要加些火酒以得回二十安士為度此藥酒外治用多

內服每用三十滴至一錢和稀粥水服之 凡外用開水

每一錢須加水五安士又由漸而加乃可 凡毒瘡腐爛

以布溼透貼之甚效

解毒油類

丁香油

交硫釐油

茴芹油

加枝撥油

以

上四等油，覈其質性，與加播匿酸、沙朥仙酸、安息酸頗相似。

丁香油內有釐類

白少勿似釐類
種油內有釐類

丁香油

功用

能止腦筋痛

凡壞牙處腦筋痛者，以綿花

涇油塞痛處可止。

一方

丁香油

一錢

交硫釐油

一錢

茴芹油

一錢

安

息香酒

四安土

桂皮酒

四安土

和勻，以連布涇透，貼痛處。

外用油布蓋住，免其洩氣，止痛為度。可治腋下狐臭、脚

丫臭氣甚效。

此方若加些火酒和服，可祛腸內風氣。

加枝撥油功用專殺皮處症微絲細蟲。

引症外出論

凡症伏臟腑原難拔出然不用藥拔出則該症何以能除此引病外出之法所由特設也顧其法則有三 一用藥外塗皮肉

而令發紅熱 一貼吊膏而令作水泡 一用丹打爛皮肉而

令發膿瘡 此皆使其血毒發外而該症庶易療治 其令發

紅熱者如用煉椒芥末薄荷油及藥酒等類是也 其令作水

泡者如用斑蝥及輕淡水即藥水等藥是也 其令發膿瘡者如

銀丹、銀養、銀綠、強水及用火灸等法是也

大抵症屬臟腑者固能使隱伏之症而發見而

症屬皮膚者亦能使延纏之症而速愈也 又況已上各藥尚

此藥者宜於發藥者是
其內宜而發者可用也

口此法能毒向能止血能打爛
患處而毒去其毒根症不端有宜

有諸多妙用，詳見上下文內，而非徒能引症外出也。如斑、痧、銀丹等物，並能療治多症。是西國以此法療病，甚為通行。惟當炎症初起，未可遽用，須先服藥，減輕其熱，然後用之，方安。

黑芥末

此物在西國分黑白二種黑者有油白者則否未研

之前無味研幼後則色黃而味苦辛以法燻去其油而苦

辣乃略減大抵黑者一種尤為辛辣服至一錢即能作嘔

功用

救誤服鴉片用以取吐和牛奶服可調胃外敷皮肉能

發紅熱而起水泡功能引炎西醫用以外敷誠為通行之

品也

用法

芥末粥渣各半和勻敷之 一法 麥糠 八兩 甘菊花

一錢 先以沸水攪勻鋪在布上隨即加上芥末柴末宜預以清水調然

後外敷約一刻發痛異常即宜撤去洗淨另用清油塗之

可也但已上二法名實敷貼能作水泡及爛 又法 用芥末蛋白和勻敷

之此法在小兒亦可用緣有蛋白相調便不患其酷烈也

若小兒則用芥末麪粉各半而以水攪勻敷之

但敷芥末須以薄布開調敷

則再加上
一布護

主治

牙痛宜敷頰部 喉症宜敷心口 腦筋作痛骨節發

腫及患走風脚症宜敷患處 臟腑內若發炎須按其部

位敷之 肚痛心痛及風溼骨痛用以外敷甚驗 頭上

或作痛或發炎與及顛狂等症宜敷腳心引症下去 傷

風頭刺及患風溼等症即用芥末調水浸足亦頗見效

芥末紙

製法

芥末 錢半

樹膠帶 化水
足用

與芥末相和成

糊刷勻於紙上曬乾臨用時先以暖水浸而貼之

主治 引炎出外可作吊膏之用

亞匿加膏 製法

亞匿加膏 火酒浸一安半 松香膏 三安土

隔水法炖煖和勻

主治 風溼骨痛跌打用紙或布開貼患處

把根地膏藥方 治風溼骨痛

把根地膏 七十二安土 黃蠟 六安土

煮溶不住手攪勻至稠結為度

又方 治風溼骨痛跌打

把根地膏 二十安土 乳香 十二安土 松香 四安土 黃蠟 四安土

西藥畧釋 卷四 引痰出開 亞匿加膏 把根地膏 三

荳蔻油

一安士

白攪油

兩安士

清水

兩安士

先將上四藥煮熔，次加荳蔻等油與水，煎至不稀不稠，煎時不住手攪勻，用時以布開勻貼患處。

松香膏

製法

松香一物，由松脂凝結而成，內面有油，但西國則多經甌煉，業已提去其油，若中土所產，雖未經甌煉，而該油亦每多洩去。

形色

色略黃，質甚脆。

氣味

頗似松節油。

溶化

用火燵之，即有黑烟上升，若煎熔，則能與油蠟相合。

水不能化伊打與火酒均能化

功用 療治各症多作膏藥用

膏藥方

松香 七十二安土 黃蠟 六安土 熬熔攪勻貼患處

主治 風溼去腐生肌

把根地和斑蝥膏 製法

把根地膏 四十八安土 斑蝥膏 四安土

用隔水法炖斑蝥膏至十五個咪呢之久用布濾隔後加

把根地膏再隔水煮熔攪勻冷凝用布開貼

主治 風溼骨痛內炎腫熱

西藥學 卷一 附錄 把根地和斑蝥膏 三

又方

此方英國醫生傳

斑蝥末

四安土
粗研

荳蔻油

四安土

黃蠟

四安土

松香

四安土

番鹼膏

三十兩

把地根膏

二十兩

滾水

十六安土

先將斑蝥末浸入滾水內六點鐘之久用布隔並搥盡其水煎至賸三份一再將各藥一齊加入熬熔不佳手攪至極勻冷定攤於布上用之

主治

風濕骨痛跌撲發炎俱效

又膏藥方

布國醫生傳

松香

五十安土

黃蠟

五十安土

松節油

三十七安土

把地根膏

二十

五安土

綿羊油

二十安土

以上各味慢火熬熔加入斑蝥末十八安土攪至極勻開布攤貼

形色 純黑

氣味 未詳

此膏藥功力峻於把根地松香等膏藥

主治 一切風溼骨痛肺內皮發舊炎均可按患處部位貼之

輕淡水 夏名亞 摩尼亞 製法形色氣味功用俱詳上文改病門篇內矣

茲論其引症外出一方而已

方劑 治風溼骨痛甚驗

輕淡水 一安 七量 白欖油 三安 七量 或 用生油亦可 和勻外搽

西藥學 卷一 引症外門 輕淡水 三

樟腦藥酒

製法

樟腦

一安士搗碎或研末火酒少許調之

白欖油

四安士或生油亦可

形色

清如水無色

氣味

香烈

功用

祛風行血

主治

風溼骨絞痛外用擦患處

又樟腦酒方

樟腦

二兩

蜡芬大油

一錢

輕淡水

五安士

火酒

十五安士

以樟腦及蜡芬大油入火酒內溶化漸加輕淡水卽是

功用

同上

番鹼藥酒方

番鹼

四安土切極薄

樟腦

兩安土

玫瑰香油

三十滴

清水

六安土

火酒

三十二安土

先以清水溶化番鹼次以火酒化樟腦及

香油化後併歸一處以紙隔之乃可用

形色

淡黃

氣味

芳辣

功用

同上

松節油藥酒方

專治各處腦筋作痛

風溼跌打皆可用

松節油

一安土

醋強酸

一安土

樟腦藥酒

一安土

和勻

松節油製法已詳利小便門第

篇內

樟腦藥酒已詳上文

方劑

一方

擦風溼跌打骨痛及腳痠痛均妙

松節油

兩安土量

生油

二安土

樟腦酒

一安土量

輕淡水

一錢

和勻用擦患處

又方 治全上並治骨絞各症如風痰鶴膝等類

松節油 一兩 二錢 生油 一兩 樟腦 二錢 半 醋強酸 一兩 二錢

和勻擦患處

又治湯火傷膏藥方

松節油 五兩 松香藥膏 十二兩 研和紗紙開貼甚驗

辣椒 樹高 三 尺子極繁中國西國皆有種植

形色 分紅綠二種入藥用尖長者宜用酒及水浸之

氣味 其臭略香其味苦辣 考覈 此椒內面有精西醫所

謂夾西先者即該精之名也用法取出其辣異常若將半

釐放於座上而凡或其臭者莫不嚏噴是知辣椒功力全在此精耳

功用

大抵內服辣椒能令腹暖及能助胃消化塗在皮肉能

發紅熱久則並作水泡外擦風溼骨痛跌打等症甚驗

藥酒方

辣椒

六錢

火酒

二十安
土量

其製法宜照上文路卑

利酒方每服五滴至三十滴

一方

卽用此酒

四錢

玫瑰水

八安
土量

和勻喉內發炎嗽

口甚安

水火之法

西醫治病不僅燬化金石草木以取其精液於用

水用火以升表其病深得自然氣化之妙學者切宜留心不可

西藥畧釋

卷四 痢疾

辣椒 水火之法

因其淺易而忽略之也

主治用法

凡身體四肢作痛，或內臟各部痛，查明係無身熱及非發炎者，則宜用冷水布鋪於各痛處可止。至若內臟或肢體發炎，紅腫作痛，則宜用冷水布鋪之乃可。若身弱寒顫之病，或屬幼兒，可焙熱絨布裹之。腦筋作痛，用乾布焙熱鋪之，或背脊惡寒不安，亦可用。肚痛用熱水浸能止。幼兒傷風初起，或發熱，或抽筋，皆用熱水浸之可止。傷風初起，熱水浸腳，啜熱茶，亦能發表。膀胱內皮發炎，小便澀痛，婦人閉經，以盆盛熱水，坐浸日三次，自愈。論火氣詳於行腦氣及血第 卷十 筋內查閱

便知

巴豆油

此油已詳上瀉藥，若用以引炎，功力亦峻。

驗狀

大抵將油塗在皮肉間，數點鐘能發熱而起紅粒，且該粒由漸生大，彼此相連，則將變為膿瘡，自可引症外出。

主治用法

凡內傷及久咳等症，宜用此油搽胸前。頭腦積血，宜用此油搽頸後。臟腑患病已久，宜按其部位搽之。已

上各症，均宜搽至發出膿瘡為度。若膿瘡既發，則另塗白

藥膏可也。

斑蝥

斑蝥乃葶莢飛蟲也，中土甚多，其形與西國有別，而功

用則一，取以研末，作藥殊多功效。

西藥畧釋

巴豆油

斑蝥膏

三三

斑蝥吊膏方

斑蝥末

一觔

黃蠟

八兩

松香

八兩

豬油

八兩

先將黃蠟、松香、豬油煮溶，然後將斑蝥末加入攪至凝

結為度。此膏用布開調，或紙亦可。大約貼三四點鐘，或五六點鐘，俟

其略起水泡，隨即撤去，再用麥糠、甘菊敷之，或用爛飯敷之。

功用 其妙有三：一能行氣血，一能引炎外出，一能令

熱消散而免生翳膜。

用法

凡臟腑發炎，俟其稍退，宜貼此膏，令引炎出。

頭腦積

血、伏熱等症，宜先用藥清熱，次用吊膏貼頸後及小腿裏。

眼內久患熱症，宜貼太陽穴及貼耳後頸後等處，自可

免生翳膜。肺內熱症已退，尚覺痛而未愈，宜貼胸前。

腦筋作痛宜貼患處若骨絞發腫宜貼數次方能見效

裁酌

貼此膏宜分症之輕重其在輕症則俟水泡起後隨即刺穿另用白藥膏潤之其在重症則刺破水泡之後並宜揭去其皮而復用松香黃膏貼之令膿盡發庶易獲效至小兒貼此吊膏須將白藥膏加入令勿過烈為安

斑蝥紙

製法

白蠟

四安土

鯨魚蠟

一安半

白攪油

兩安土

咖拏叮松香

半安土

斑蝥末

半安土

清水

五安土

和勻用白鐵罐熬沸

慢火至兩點鐘久不住手攪勻絨布隔之流盡為度不必搾藥渣之水用一方平器皿傾藥水於中臨過紙時慢火燂熔以手

捻紙兩頭，輕勻拖過，僅溼紙下一邊，取起備用。

功用 略遜斑蝥膏，風溼腦筋痛等皆可用，且雅潔不污衣。

斑蝥酒 方 凡風溼症，擦之甚效。

斑蝥 一錢 芥末 四錢 胡椒 四錢 檀腦 四錢 蒜頭

一顆 白醋 四兩 火酒 十二安土 和勻，同浸七日，濾淨。

鐵烙之法 功用 去腐肉，療痔症，亦可引症外出。

用法 將鐵條煨紅，少頃，俟轉黑色，以磨患處，如此，則腐肉自去，療痔症，先將該痔剪去，次以鐵條燻熱磨之。

鐵養水 製法

鐵炭養 十六安土 秤 石灰 十二安土 秤 清水 一百六十

即淨糠沙

安土量

先以水化銀炭養入鐘鐘宜先燙煎之後將石灰徐徐加入用箸頻攪

再復煎沸少頃俟雜質墜底然後用曲玻璃管形如甬角令此藥水入鐘

法將該管先滿以水斷其兩頭於是二頭放入鐘內二頭接入鐘內旋即放開管口如此則該藥來自可乘氣而走過鐘中矣且此鐘用土色者尤佳隨即封密凡毒瘡不能

收口卽以此淡藥水塗之可治

銀養丹 製法

卽以銀養水入銀鍋或鐵鍋烈火煎乾煎至稠如膏油爲度隨以玻

條挑出少許俟冷凝爲堅實之質方可停火否則再煎可也由

是以模子印成藥條其藥條亦宜乘熱入罇封固

形色 色白體潤而滑露天氣則變爲流質

氣味 無臭味鹹而辛 溶化 清水火酒均能溶化

又法 用鈇養二 石灰一 擇其新煨而未過者乃佳 先將鈇養熬熔然後

以漸加入石灰隨將玻條攪勻攪至成膏仍用模子印作

藥條俟乾後外塗以漆自不至發潮也

功用 此等藥條功力甚烈磨而搽之能將皮肉打爛

一方 用鈇養石灰各半和勻以罇貯密用時則以火酒少

許調化可也

慎用 此散久敷皮肉能令瘀黑及覺痛熱異常 大約痛至五六日即愈 越數

日瘀黑退去則變為膿瘡其酷烈有如此

主治 凡療癰癤鹹疔及被蛇傷等症其應將患處打爛者均

宜用此敷之 但皮肉應打爛多寡須先以隔紙剪開

一孔鋪上令其露出

此孔或覆或管須相處處之

然後以藥投入孔裏庶免侵

累別處蓋凡屬酷烈之藥無論或塗或敷均宜用斯法也

大約敷塗片刻即宜撤去而再以爛飯鋪之如此則患處之肉未幾即爛也俟腐肉去清另以藥膏敷上而患口自可愈

銻養酸

此蓋用銻銻養調水加入磺養製成者也

形色

凝珠纖小恍似針形色深紅氣味味辣澀具有丹

力酷烈異常

辨別

用作藥水亦分濃淡二種淡者可作斂劑濃者直同硝

強能將皮肉打爛而藥力並可深入

西醫最一確試以此藥水浸之能令其全化亦足見藥力之猛烈矣

功用

凡贅門患痔及前陰因花柳而發毒粒形同用此塗之均

能打爛一法用水調化藥珠少許調至如漿隨將玻

條塗在患處約片刻即以溼布抹去旋用乾布蓋護如此

則患處之肉自能打爛也迨腐肉脫清亦宜另用藥膏敷

之

銀淡養

此藥已詳上補劑但內服固有奇效而外塗尤多妙

用也

功用

以藥條蘸水搽上皮膚能令變黑久則並作水

泡而皮肉因之而爛若搽腐肉先變白而後轉黑

主治

凡鹹疔腐瘡等症均宜用此藥條搽之喉內久患炎

症搽之亦妙婦人乳頭裂爛削尖藥條搽入其罅直前如

公乃易或以治子宮口生瘡亦宜用法搽之 瘡利用此藥一分

清水一安和化外塗 眼科用此藥二釐或五釐 清水一安調

化搽之甚驗 喉症用此藥七分 清水一安和化隨以竹

紫海絨蘸而搽之 推之俗名飯蔬及雞眼等症用此藥亦可搽治惟先以淨角磨透次以小刀割平然後搽之庶易奏效

方調 凡作丹用以此藥為最通行緣其功力不甚酷烈也

至若搽藥過多而轉以貽害即用生鹽水洗之可解

淡養酸 即硝磺酸 此藥水用作服劑已詳上補藥篇若作丹用功力

尤峻 **主治** 下陰因花柳而發毒粒者形同用此水搽之

良 臧疳乍起塗之亦妙 若療內痔宜用法搽之 法以機器插大撐開

藥師先行拭淨通以濃醋調水搽其患處去抵便搽一次則痛約兩三點鐘方止若搽至兩三次則不甚痛而漸可愈也且內痔係成塊而厚者宜用此法若在粒而多者則用別法可也

此藥畧釋 卷四引症外出門 淡養酸 永樂養丹

汞炭丹

即汞硝強丹 製法

淨汞

三兩二錢

濃硝強水

五安土量

清水

半安量

先將濃硝強水與清水和勻，隨以淨汞加入，令其鎔化，化後煎沸約一刻久，俟冷取出，貯入玻璃樽。

形色

氣味

功力甚烈，能爛皮肉。

主治

背癰及蠶食桑疔，宜用。

用此搽之。

若患陂尼之症，多生小粒者。

蠶食桑疔一症，見皮膚新編。

宜用。

玻筆濡此藥水，按粒點之。

瘡若發膿，亦用此藥水點在。

瘡頭。

凡搽毒瘡，宜向患處約搽方寸便可，次用布蘸水。

鋪之大抵搽後，即變白色，未幾發炎，隨結黃靨，不久自愈。

錐綠丹

製法

錐質

十六安土秤
宜擇其鬆者

鹽強酸

四十安
安土量

雨水

二十安
土量

錐炭養

半安
土秤

綠氣水備足

先將錐質鹽強酸及雨水

和勻倒入磁鍋隨將鍋坐入沙釜釜下用慢火燂熟燂至藥水

不見發氣然後加火煎沸約歷半點鐘再加雨水熬之熬至該

藥之水如初方可停火停火後亦宜隨時攪動俟過廿四點鐘

濾淨貯入大罇

罇以龍藏水
在空者為宜

然後將綠氣水徐徐加入罇內而頻

攪之至該藥水亦有綠氣水臭味為度其餘尚有錐炭養則逐

少加入而復攪之攪至內有紅粉墜底為止由是用紙隔之再

復倒入磁鍋煎去該水隨用小玻條探驗俟冷後見有物白而

實者附於玻條

其光
皆鹽

如此便可製成是藥矣但此藥煎乾後宜

卽倒入模子印成藥條其藥條亦宜乘熱貯入玻璃樽又法或

將此煎濃之藥倒在石面俟冷定變作一塊而後打碎入樽亦

可

形色 質軟恍如黃蠟色白或略灰能過光露天氣則發

潮氣味 鍊 **溶化** 清水伊打火酒均能化若用火

煙熔並能飛散

功用 此藥具有丹力能打爛皮肉外科用之甚妙第藥性酷

毒誤服之輒能壞人 **服法** 惟加水冲至甚淡方可內

服服之亦能補腦及行血氣也

但內服者極少

外治 用鐸綠丹一分 麵粉 二分至五分 和勻製作藥餅用敷

毒瘡甚驗但藥味欲其濃則用麪粉二三分藥味欲其淡

則用麵粉四五分蓋瘡有大小輕重不同酌用之可也大抵藥餅之大而厚者其功力則能久敷藥餅之小而薄者其功力不能久敷也但用以敷瘡其藥餅亦不宜於太厚誠恐打爛過多及疼痛過甚也要之此藥雖毒而用以外敷亦只能打爛患處皮肉而弗至連累別處即該毒亦不患其侵入也

白礬

即礬乳礬毒

將此物煨作枯礬研摻潰瘡能去腐肉已詳上斂劑

內

錐礬

此物能作丹用已詳上吐藥篇

銅礬

即礬礬毒

可作丹用已詳上吐藥篇

火氣用火氣之法已詳上文行腦氣及血門篇內矣

內藥畧釋

卷四引症外門

礬 錐礬 銅礬 礬乳 礬毒

知

三

消炎腫潤皮去毒藥論

夫西藥論攻補表吐之法，行腦氣行血之品，平脈平脂之藥，固詳且備矣。然皮腠之間，臟腑網膜，忽患紅腫作痛，俗所謂無名腫毒。西醫謂之發炎是也。割之不能攻之不可，惟有消其腫痛，或令其成膿而拔之出外，爲妙法也。至臭腐毒瘡，則止痛辟穢爲先，冀其漸愈。此又於刀針之外，別開法門也。另附各土藥，可消腫毒火傷跌打之患者，俾村野農民難於購藥，尋醫者隨時隨處，皆可就便采用耳。

卷四

馬

甘油

此卽用製番鹹所賸之水煉成者也蓋番鹹係豬膏及

鹹水等物所製茲則將其所賸之水先行煎乾後如火酒令其食出該油濾淨而隨將火酒煎去如此則所賸者卽甘油也由是再加工生物煉成之炭煎沸而復濾淨數次務至無色無臭方爲純淨

形色

此物用指探之恍如清油

氣味

頗甜

溶化

清水伊打火酒均能溶化

此油亦能化別種藥水

功用

療症作潤劑用凡用藥外治而宜加入甘油者蓋取其

能潤而不至驟乾也

外治

一方

甘油

一安士量

石灰水

四安士量

玫瑰水

三安士量

和勻。凡被湯火所傷而非屬重症者，卽用此搽之，甚驗。且酷暑之時，其頸下腋下及前後陰罅隙等處，或因汗積而搔損者，亦宜以此搽之。

一方 甘油半安土量 玫瑰水七箇半安土量 硼砂五分至一錢 和勻。

凡婦人乳頭爛而生罅者，用此塗之，甚效。卽冬天手生拆口，搽之亦妙。且患耳聾而屬焦乾者，其在淺症，宜塗

此油，或滴入亦可。若用綿蘸油塞入耳內，則宜早晚換之。

花士玲 凡做煤氣所賸之內，可製成藥數等，有花士玲在內。

用法取出製淨用。

形色 淡黃如脂。

氣味 日久不走變。

功用 最潤合和別藥爲膏或獨用以塗損傷處 眼邊爛亦

可搽塗刀劍鐵器不銹

火綿酒 **製法**

火綿 八錢

伊打酒

三十六安士量

火酒

十二安士量

先將二酒

和勻後以火綿加入則自能溶化而製成是酒也

形色

此酒略稠無色並能透光

氣味

氣息恍如伊打宜用玻璃樽貯密

配合

但此酒每一百分須加入甘油二分蓋取其能潤也

功用

此酒用筆搽在患處較久少頃而酒即飛去能遺下一

塊光薄之皮涵蓋患處醫者觀之白可洞徹見底如此治

法蓋能使天時不正之氣及外水無從侵入而療治庶易奏效

白樹膠末

此樹產亞喇卑亞亞非利加北邊等處宜熱地沙

土樹更繁茂有高四五丈者細葉圓長對出花白微黃恍同鬆開絲纓其膠係從樹身流出或用刀割破樹皮俟其自乾或晒乾用

形色

有黃有白藥肆所售者或大粒小粒不等上品者色白微黃乾燥不相粘連間有微紅微黃色者研末則皆成白色下等黃白不一雜有沙泥樹屑在內不能純淨故而互相粘成一團以此分別優劣

氣味

無臭味略甜淨者口含可以化盡

溶化

不拘冷水沸水皆可化化後成樹膠水再復煎乾可得回原重之數並無耗少惟火酒伊打酒各等油類均不能化凡經水化者加入火酒能令凝結

較駁

比水略重水一則此膠粒重一零四投入水內可沉到底

底

功用

主滑潤

凡喉痛及胃內皮發炎用以潤之

大熱症可用作食物

爲末可和小丸以免粘連之用又

凡藥散水不能化者用樹膠水和之令此藥散浮上以便

飲服

胡麻子

西國中國各處皆有所植每年栽換一次高二尺餘

西藥畧釋

卷四

消炎腫門

胡麻子

墨

外殼圓而小，曝乾打脫取子肉用。

形色

色黃黑，內面有油。

氣味

生無氣味，燻熟微香。

功用

解毒行血。

方劑

一方

胡麻子

四安杵
爲末

生油

四錢

沸水

半觔

先以沸水將

胡麻末和勻，漸逐加入生油，加時不住手攪勻。

主治

凡皮肉發炎紅腫，成瘡未破者，及心肺肝胃大小腸發

炎作痛，按照各處部位，在外敷之，勿令勞動，可減輕炎痛。

漸漸消散在外者，則或消或熟，令其成膿穿破出外，不至

釀成大患。

附消腫潤皮等方

麥皮

四兩或半斤

甘菊花

四錢

胡麻子

六錢

和煮成稀

糊乘熱敷之

其用有三

一取其溫暖

一取其溼潤

一取其軟滑故能引炎腫從外而消也

主治

凡肌膚發炎骨節發炎腫痛外敷患處勿令發炎肢體

轉動冷即換熱者再敷內腑等處或連網發炎可按各

部位在外敷之勿勞動甚效

榆樹皮

刨花

以暖水浸之可敷熱腫之處或和以胡麻子

末甘草末連刨花溼敷之亦取其溫軟溼潤以止痛消腫

之效耳

又敷治腐爛毒瘡奸炒之類二方

酵水 六安

灰麪 十四安

清水 六安熱至一百度方合即大暖水

先以暖水和勻酵水漸加入灰麪不住手攪勻放近火爐俟其發起以布開勻敷患處止痛辟臭穢之氣

又方

堅炭末

研極幼半安量

麪包

兩安土量

胡麻子末

半安

沸水

十安土量

先以沸水浸麪包十咪呢之久攪勻漸加入

胡麻子末以一半堅炭末攪勻用布開調再將一半堅炭

末摻勻上面作一服敷貼患處

上各方係敷紅腫作痛瘡未穿破之處此二方用酵水堅炭末

係敷治毒瘡臭腐之處故藥品不同醫者擇而用之各得其要可也

按外敷消腫山草藥等方各處土人多有識者如山茨菇拔

毒消癰火殃筋火炭茂文樹蘭瓜子菜芙蓉花

葉奴木棉花忍冬花甘草苦參生地黃芩

梔子蓖麻子葉蕉葉旱蓮草等草藥或杵爛和灰麪

煮糊或熬水洗皆可消腫散熱至若蒲公英能消婦人乳

癰舊茶葉油可消湯火重傷胭脂花蠟梅

油可治小兒爛痘絲瓜皮苦瓜皮槐柳桃李枝葉熬水皆

可祛風腫三七王不留行石勒草紅花葱蒜汁霸王鞭七星

劍凡對葉方骨之草杵爛以酒麪煮糊敷傷腫瘀痛之處可以見效若跌打刀傷流血不止在西醫則以冷水洗淨創口紮住血脈管而血自止外以瑪膏及縫回外皮是又另有專書詳查割症庶可知其梗概也已

論解酸之劑

凡遇胃腸酸溢則不免腹痛發瀉此解酸之劑所由設也大抵能與酸相合而並能敗酸之力者卽謂之解酸藥蓋該藥有三一屬蛤利類一屬似蛤利之土類一屬蛤利合炭強所作之鹽醫者宜分晰也但此藥非具療病功力惟酸溢能化而使勿爲患耳服是藥者宜與補劑及去風劑同服凡腹痛作瀉係因酸而致者服此可止湯變酸而將作砂石淋服之亦驗此藥宜晨早或飯前空心服服後凡一切酸甜肥膩煎燭等物均宜戒之至服解酸劑其蛤利在腸胃間有與厥酸相合而作爲瀉藥者如鈹養鉄養是也若鈹養則不然要之胃經

本須有酸方能消化食物、故此藥亦不宜過服、久服、否則令腹
不消化、而漸致噎食、由是血弱身虛、及發盜汗、而反難療治、是
不可不慎用也

石灰

即熟

此物冷水難化而熱水尤難化其在新燒成者力能化

已萎植物故或以之糞田乾者內服不免壞人惟浸水濾淨服

之而後人胃無傷功能解酸及止津液但不可過服久服耳

考覈

大抵新煅石灰具有丹力和以鑿礪能去腐肉並含髮

脫

方劑

一方

石灰二

清水三

相和再加入輕礪氣至灰水不能食

氣而狀如膏油為度由是將此水塗於毛際少頃隨用竹

片刮之則毛脫不痛

一方

石灰三兩

汽水六斤

泡化貯入玻璃療病則

西藥畧釋

卷四

解酸門

石灰

四

取極清者用，凡腸胃因酸作瀉，及尿變酸者，宜服。痢症及作悶吐，用此灰水和牛奶各半同服，可治。噎食症，用此灰水一半奶二和服，服時忌食別物。小兒舌生白苔，及瀉青，服此亦佳。

雜治

除小兒血痣，用新石灰、洋鱗等分，和研，另以軟皮剪一穴而小於痣者，隨將皮穴蒙在痣上，而以藥塗所露之痣面，不久自除。耳孔喉際，及男婦前後陰，出惡液，宜以石灰水洗之。金錢癬、爛頭、瘡及惡瘡，用以洗之，亦驗。婦人肛門前陰發癢，洗此水亦可止。白帶宜用此水射入，內傷用石灰水化汽吸入肺內。一方石灰水

十六安
土量

汞綠毒藥 五分

和作黃水凡不收口毒瘡塗

之即驗

一方 清石灰水 十六安
土量

迦路米 二錢

和

作黑水用搽皰疽疔毒甚效

洗癩一方 石灰 十兩

清水 四觔
半

浸濾日洗一次

治湯火傷方 石灰水 濾

淨

生油

各等分攪至融洽以鷺翎塗患處甚妙

淨火石粉 製法

火石粉一觔下砵加以少水研幼研至稠結如漿再加入
多水攪勻少頃俟其粗粉墜底即將上面白水倒往別盆
盆內先貯清水其餘粗粉再行研幼加少調勻少頃復將
白水倒在別盆俟其幼粉悉墜於底然後將上面清水棄

本草綱目 卷四 二 五

去俟乾後用樽貯密

形色 灰白

氣味 無臭

服法 每服一分至七分

功用 解酸調胃

主治 胃不消化發酸腹有酸

痢症宜服

一方

淨火石粉 四錢

樹膠粉 二錢

冰花糖 二錢

桂皮水

四安土量 清水 四安土量

先將二粉與冰花糖下砵研勻入以

少水調洽然後加入餘水及桂皮水以瓶貯之 皆用藥水時宜將瓶搥勻 每

服一酒杯每日數服 痢症服此加些鴉片酒 或鴉片酒 更妙

珍珠 石決明 牡蠣 蛤粉 鍾乳石

石蟹 凝水石 龍骨 龍牙 雲母

已上十種，特珍本草，誇其諸多妙用，而究無實據。西醫醫用法，細覈始知各物均函有石質，及炭養氣，故功用祇同火石粉。若用烈火煨之，則炭養氣散去，即變為石灰。其妙處不過如此。然則入藥者，何必區區珍珠等物，而徒取其貴也？誠知火石粉一物，足以代之，則虛糜可省矣。但此物必須研細飛淨，乃堪內服。至若論其功用，亦只解酸而已。製法詳上引症外出篇。

形色 無色 氣味 無臭而味清

西藥製擇 西醫醫 解酸門 鍾養水 鍾雙炭養 鍾養

考覈

以草藍變紅紙試之立返藍色大抵此水能食人皮

肉若以指蘸而擲之恍如油滑

功用

解酸利小便

服法

每服十滴至三十滴

主治

凡腸胃有酸及溺變酸者宜服

慎用

藥性酷烈須以多水沖和方可內服故應服此藥者或

改服礬炭養尤佳

礬雙炭養

製法形性詳上利小便篇若用以解酸每服三

分至七分

礬養

製法以礬炭養下瓦礮即鑄銀礬煅兩點鐘久俟炭養散

盡便可製成礬養也

功用 取瀉解酸治痢

服法 每服分半至四分日兩服

主治 因酸濫而胃不消化 砂淋症係由尿酸而致者 腦

作痛係因胃滯而致者 小兒痢症由於胃酸者皆宜服

酒風腳症服之亦驗

鉤炭養

即鹽蘇打

製法

先以生鹽加入礮强水令其變為鉤礮

養焙乾再將此物與未經煨灰之石各半研細然後加入堅炭

末五分一併研勻隨即放入曲炭爐內圖見卷二用火射煨煨至熔

成一團變作黑色大約此物經煨每百觔內有鉤炭養三十六

觔此則宜浸以清水令提出鉤炭養可也提出後即以火煎乾

再約用此散三觔乃加木屑即木一觔如欲多製是藥則按照此數推算可也和勻入爐煨熔

仍用曲
散爐

如此則木屑自變爲炭養氣而與鎬質相合也大抵此散復經煅後每百觔則函有鎬炭養五十觔由是以水化之濾淨再煎煎至上面起有一層薄綿爲度俟冷凝珠傾去餘水再復焙乾方可入樽

形色

珠色白露天氣則水耗散而變爲白粉

氣味

鹹澀

溶化

清水易化若煨煅則本身之水能化已質煅久則枯

功用

解酸

一服法

每服宜用分半至五分

主治

凡胃不消化發酸及渴變酸酒風腳癰癰氣癰咳症均

宜服

膽淋症服此甚效

乾癰退皮癰宜內服外搽

慎用 顧此藥不宜多服，否則未免壞人。

一方 洗癬

鎬炭養 二錢或三錢

清水 十六安土量

沖化外洗癬症甚效

又方 治癬

鎬炭養 一分至一錢

豬油 八錢

和勻作膏用塗癬症亦妙

者訂 但此藥原具之水能化汽飛散，故入藥分兩，殊難作準。

不若用其枯者尤妙也。枯者每服宜用八釐至二分半。

和番鹹甘草末作丸內服。

蘇打 即野養炭養 欲製是藥者，宜先置一小木箱在左，及用雙口玻

瓶兩個在右，分列甲乙次第，其木箱則約離底三四寸加上一

板該板全塊均有小孔板下之旁亦有一竅通氣其居中之乙瓶則內貯清水且宜將一玻璃管插入此瓶屬在右便之口由是將象皮管自甲瓶屬左之口起鑲連至箱旁之竅令其互相通氣佈置停妥先將鎔炭養放在箱內板上隨卽蓋密次將鉅炭養錫放入甲瓶並加些礬強水如此則鉅炭養自然熔化而令炭養氣先從本瓶之口透至乙瓶令過清水滌淨然後透入木箱由板下之孔升上將見鎔炭養能食炭養氣而自變爲鎔養炭養矣

形色

新製著作塊色白而不能過光且不發潮宜焙乾研末

入罇

氣味

味鹹不澀與鎬炭養有別

溶化

冷水一十三倍方能化一惟忌用熱水誠以熱水一冲即能敗炭養也

功用

解酸

主治

凡砂淋症係由尿酸而致者宜服

瀉痢係由胃酸而致者宜服腦氣筋痛係由腹酸而致者宜服且胃不消化發酸服之均驗

方劑

一方 膽淋症

鎬養炭養

二錢

煖水

土量

調化分二三次服盡如服

後作吐應行補服或加入鴉片酒數滴再服尤妙

一方 小兒腹瀉

鑄養炭養七釐

大黃三釐

依畢格一釐

以水和化作一服每日二三服

一方 妊婦作嘔

鑄養炭養分半至二分半

鴉片酒些少或白寇酒亦佳

作一服可止

一方 乾咳無痰

鑄養炭養二分至五分

每日分數次用水沖服外以鹽水浴體

一方 初患風溼

鑄養炭養二錢

樟腦水八安土量

和化每服半茶杯每三

點鐘一服外以鑄養炭養一兩六錢沖水一桶浴體可治

一方 乾癩及癬

鑄養炭養

二分半

每日分兩三次服，歷三日後，每日加服一

分，加至每日共服一錢爲度。

滑石


此物質膏經細敷，乃鎂養也。而腹具酸者，服此則能合

酸作瀉。

辨止

至時珍本草謂其能療石淋、黃疸、水腫、腳

氣吐血、衄血、諸瘡腫毒，而且去身熱、補脾胃、能通九竅、六腑津液。此不過鋪張揚厲之詞，誠未必有此大用也。



蒙藥論

凡人遇割大症靡不畏懼醫者於此欲其不能妄動及不甚覺痛斷非蒙藥不爲功此西醫割症咸以蒙藥爲極妙之品也

顧蒙藥有數種 一伊打酒 一哥羅方 一淡養氣 一炭

磺 一炭輕即西名了散 一炭輕即西名了來連 一了薛同 皆能令嗅其氣而

旋即昏迷也 大抵各藥均有炭質而輒易飛去人若嗅之

則由肺入血而即令氣促脈數及在腦處而發其功刀道未幾

則身軟神倦而冥然罔覺也 若論藥性酷烈則首推哥羅方

其次莫如伊打酒所慮者哥羅方則每易壞人而伊打酒亦能

令頭刺痛及身不安耳醫者於此正宜慎用 且各藥功用雖

本相同而人嗅之則不無少異有嗅少頃而卽蒙者有嗅頗久而始蒙者未可以一律論也至若因嗅而或致氣絕醫者卽宜救醒一以冷水灑面醋強點舌及令嗅輕淡水而使之速醒一用法助其復生呼吸之氣西國有急救生呼吸器器也一用電氣震動其身一大闔門牖以納生氣及用扇搨之令生氣透入鼻口一用鉗拊舌令勿縮入以通呼吸依此救法而自可復甦又况各種蒙藥非徒割症宜用也卽推之腦氣筋痛風溼骨痛等症而用以外治亦可略止不愈見其功用之宏耶

伊打酒

形色氣味功用已詳上文行血及腦氣門篇內矣茲

不再述用作蒙藥功力與下文噶羅方同

用法

凡割大症卽將此酒斟在布或海絨而用以掩其鼻口

離開少許如此則藥氣自可吸入肺裏而割去亦不甚覺

痛也若割小症亦可用斯酒噴于割處者其法用織口

玻管器具納此藥酒

但酒實用
氣酌方

隨卽鐵連氣喉用以射在割

處此法亦能止痛

嗅驗

在病者乍嗅覺喉熱而咳渾身發煖恍如微醉由是耳

則鳴目則眩而口若不知味鼻若不知臭且當昏蒙未甚

之時間有耳如聞美音目如睹美景甚至身則若飄然而

飛用手撫之則恍惚猶知而用刀割之則不甚覺痛迨嗅
略久而迷愈深將見全弗知覺而儼若蠢然一物此皆病
者嗅後之徵也 若在醫者當其初嗅而驗之便覺脈略
數氣略促皮略發汗面略發紅而瞳子亦從而縮小少頃
則見有或舞或歌或呼或泣而且或作悶或發狂由是則
身漸軟語漸亂氣漸渙脈漸遲眼蓋垂下睛珠朝上而眸
子則散皮膚則冷面色則或黎黑而或青白及觀其昏迷
已甚恍如死去一般 醒後則身殊倦神殊疲數日內而
口與鼻仍覺有伊打之臭即溺與汗亦仍有伊打之臭也

慎用

凡用斯酒作蒙藥快則嗅一咪呢緩則嗅二十咪呢而

自有各微醫者宜細察也

論列

考西國製此藥酒由來已久惟當時尚未知其大用迨一千八百四十六年有美國醫士麼頓者嘗以此止脫牙之痛而後悟出該酒可作蒙藥由是愈推愈廣用以割症而各國莫不效法莫不稱奇誠為絕妙之品也

哥羅方

即蒙藥

此藥水內有炭輕綠蓋用火酒鈹綠而製成者也然必須用法甑煉數次方得純淨此水無色其清如酒輒易飛

去

氣味

畧甜畧香畧辣

功用

用以療症其妙有三

一能作蒙藥

前西國一千八百三十二年製此藥是二千八百四十七年英國有

醫明此酒用法始用此作蒙藥也

一可內服

一可外塗

用法

法宜用布一幅連摺數層隨將哥羅方斟在中間外用

油布蓋護

俛是藥液走

於是囑病者睡下而令嗅之嗅時宜以布

掩其鼻上而鼻下處則略離開令藥氣透入肺內則能令病者不甚知痛及不能妄動也而大人小兒均可用

嗅驗

大抵嗅末幾則或亂言或亂動而此際必須用人扶定

迨割症時亦分兩等有略醒人事而不甚知痛者有不醒人事而全不知痛者醫者於此又宜用人佐理頻診其脈若見脈不動及無呼吸之氣即宜用法救醒是故嗅此藥者惟割大症方合用之若小症則不必嗅誠以該藥若不善用輒易害人也嘗見因嗅此而殞命者多屬小症蓋凡

人遇割雖小症莫不畏痛所以動輒欲嗅是藥而或致傷
生其實小症殊不宜嗅也倘至昏迷欲絕醫者卽宜用法
使之復甦至救法有數款已詳上蒙藥論內 然而哥羅
方一物非徒割症宜用也

雜治

小腸疝氣不能縮上亦宜嗅此令筋鬆放 妊婦難產

宜以些少嗅之令略止痛爲度若再痛則再嗅勿嫌煩數
產婦或遇筋抽不妨嗅此略多 氣喘嗅此間獲功效
續骨鉸症亦宜嗅之 至若用以內服亦能平腦寧睡
但服此水五滴則能行血氣若略多則昏醉若過服則壞
人所以一嗅一服均宜小心也 腦氣筋痛卽用此濃藥

水十五滴，搽患處，日搽三次，而痛可止。牙爛作痛，綿蘸藥水，塞入患處，亦可獲效。

一方 嚼羅方四安士量 白欖油四安士量或用生油亦可 樟腦 八錢

和勻，凡風溼骨痛，及腦氣筋痛，用此擦之，甚妙。

淡養氣即西土家藥 製法

輻淡淡養，入膽瓶內，燂熱，以寒暑表熱至四百度為率，其

瓶嘴則鑲連膠管此管用樹膠製成的，而搭入水盆盆寬闊大，盆內復設一機

器，令藥氣過水，而升入機器之裏，其製法類多如此。然

此猶未淨也，惟製成氣後，復過水三次，庶無雜質。

淨氣 製法 一用清水加入磺強少許，和勻，而即令該氣過

之二 用清水並以鈹養加入而復令該氣過之 三則

祇用清水令其連上過足三次如此則該氣庶得純淨

用溫食液並加些麝香強水和勻入膽瓶而略置於其發熱為度餘則照上注而製淨之氣比亦可作藥藥也 由是即以機器藏密此氣若

取以割症則須用一膠袋入之此袋亦用銅膠製成庶易攜帶

功用

此氣專作蒙藥而其妙有數端 一嗅之頓覺昏蒙

咪呢或三咪呢 便逆而不醒 二氣息不甚礙鼻 三甦醒亦快 四醒後不

致悶吐及無頭痛 五嗅此氣甚少壞人 凡割症用作

蒙藥大抵宜於小症不甚宜於大症蓋割小症祇需片刻

若割大症則非片刻所能誠以嗅此氣者未久即醒也

如割小肉瘤刺大膿瘡及脫患牙等症則用此最為便捷

但此氣用新製者尤佳

嗅法

即將藏氣膠袋鑲連膠管而令其嗅之佇見昏迷罔覺

也 要之此氣雖甚少貽害醫者亦宜小心不可妄用

高告

此樹產於南美利加樹高三尺餘枝繁茂花黃果紅恍

同欖形大小未詳每果內包一核葉上圓下尖長約二寸寬_{七八}

分功力即在於葉乾者用水浸之葉內面有高告_{即高告精}此類

與酸類相合製成鹽類 形色 白 氣味 苦 合製成鹽

味更苦澀或用磺強酸鹽強酸製成鹽強高告

功用

安腦止痛

主治

搽應割之處即可止痛最要

緊係割眼球之時先搽此藥則不致痛甚

甘松鉅珠

此物作片珠色白而豔臭同甘松味略苦澀功

能平腦補身

凡筋抽頭昏及腦氣筋痛服之甚驗小兒腹

內生蟲而致抽搐服之能止每服二釐每日二三服此藥功

力蓋比甘松而更峻也

麝香

麝如小鹿多產于西藏及中國四川羅蠶山谷若麝香

一物蓋由麝臍而取出者也其色棕黑其臭迴香用手撫之如

有油膩彼藥肆所售者未免多偽用藥者宜細辨也

溶化

此物伊打火酒能化而沸水蛋白亦能化

功用

壯腦補神

主治

凡腹痛抽筋作悶作嘔與及乾咳服此能治婦人週

身不安、氣虛血弱、頭昏目眩、心跳肚痛、胃不消化、月經不調等症。

服法

每服一分至二分，粥水調服，日服三次。

辨謬

考時珍本草，誇其能除百病，通諸竅，開經絡，透肌骨，解酒毒，佩之墮胎，及能治中風中氣中惡等症，誠未必有此奇效也。

西墳

此樹產歐洲之南，採葉作藥，葉內有油，宜用法瓶取之。

也。功力即在此油。

形色

氣味

苦辣。

功用

調經行子宮之血及可引炎。若用鮮葉外擦皮肉能

令立發紅熱用油亦然惟不至如芥末之烈耳

主治

婦人氣虛血弱面黃而閉經者服此甚驗惟壯婦及懷妊時忌服而

且此藥有毒亦不宜過服也

作藥方

西墳鮮葉

六兩四錢

黃蠟

二兩四錢

豬油

十二兩八錢

熬熔攪勻

凡風溼骨痛及骨缺發腫宜用此塗之既

貼弔膏後而欲令膿盡發者宜將此膏再塗

火硝

出處提取功用已於發表門詳述矣茲將通用各方列

右

一方 療風溼每服七分每日三服用薏仁湯化但每日分

兩須以漸加多服至每次一二錢而每日仍宜三服大抵

依此治法亦須服至一二旬方效患水臌者服之良

又方 婦人月經過多每日先服瀉藥後用此藥二分半至

五分薏仁湯開服

一方 療白帶

火硝一分七釐 白礬八釐 水化作一服每日三服

鐵錘製法

鐵綠礬末三箇半安士秤 鐵礬四安士秤

先將此二藥和勻放入鐵鍋另用鐵礬五安士秤雨水四安士和

化亦倒入鍋內隨將該鍋坐入沙釜釜下用火煎乾煎時
宜頻攪動俾成一團然後取出研末研末後復放入鍋以
煏至紅色而再復煏一點鐘久方可取出俟冷再行研幼
隨用雨水廿四安士量化之俟其不能化之物悉墜於底
卽倒出上面已化之水再加入沸雨水八安士量和勻濾
淨然後將濃磺強水徐徐滴入至無酸力及無哈利力爲
度由是再將此水倒入磁鍋煎至上面起有薄綿方可停
火俟冷凝珠又倒去上面之水加入雨水六安士量煎沸
隔淨俟其再復結珠而後倒清上面之水惟此時該珠尙
溼法宜用碗盛之另以一碗載濃磺強水於是用一玻罩

將此二碗覆蓋如此則珠之溼氣自飛去礪強水內即獲
乾淨此珠宜用玻璃貯密

形色

珠恍似絨色深紅每取一珠鎔以水而水亦變紅

氣味

略甜

溶化

水易化

考最

此珠內有養氣若遇白糖甘油火酒及各生物則養氣

將必離開而令生物等項粘合

功用

解毒

方劑

一方

銀鏤珠八枚

雨水

一安土量

和化外搽惡

瘡其毒頓消

婦人陰戶積臭用此藥水射入可辟且

鼻耳口內或有臭氣亦可用此滌去凡一切污穢及病

人寢室毒氣用此藥水灑之自可辟除

鉅綠散

製法

先以石灰放入磁罌蓋密隨用法令綠氣入

石灰裏如此則兩物相合即成爲鉅綠散

形色

此散頗鬆色灰白

氣味

其臭略帶綠氣味苦辣

溶化

清水可化能漂白衣服

藏貯

若露置綠氣即洩宜用玻璃貯密

功用

能解病人寢室諸般臭毒氣息法宜用散調水或灑於

地或灑於牆或用布蘸此藥水懸高自可辟之也至牢獄

茅廁及人多擠擁等處宜用此散撒在地下自能驅除一

切穢氣 毒瘡發臭用此散調水洗之 口爛及牙肉臭

腐用水調化含之

方劑

漱口用 鈹綠散一 清水百倍攪勻用之

一方

治瘡用

鈹綠散

錢

清水

八安土量

和勻搽之此

淡藥水也

一方

鈹綠散

四錢

清水

八安土量

和勻搽之此濃藥水也

製濃淡藥膏方

濃者宜將鈹綠散及豬油各半爲之淡者則

將鈹綠散減少可也

汞鉛膏

製法

淨汞

二兩四錢

白欖油

一錢或用生油亦可

硫磺汞

一分四錢

鉛膏

四兩
八錢

先以欖油逐漸調化硫末次將水銀加入須研至
不見水銀星爲度然後將鉛養膏燂熱合共和勻

功用

消腫解毒

主治

肝脾發大骨鉸發腫及頸癰等症宜用布開調以貼患

處

黑汞鉈水

製法

迦路米

五分

石灰水

十安
土量

和勻

主治

凡疳疔及日久惡瘡係由花柳而致者用此藥水搽之

甚驗

黃汞鉈水

製法

西藥彙編

卷一百一十五 雜述

黑汞鉈水

黃汞鉈水

室

汞綠毒藥 三分 石灰水 十安 和勻 此藥水搽疔毒

惡瘡等症亦妙

鋪礦養 此映相所必需之藥也然推其功用並能食別物所

函之養氣而即壞却是物

通用 彼皮膚之症生於鬚裏而恍若有枝相連者宜用鋪礦

養七分清水 一安 和勻搽之目搽數次而該枝自可剪除

婦人陰戶發痒用此搽之其痒自止若搽惡瘡 藥水宜用淡的

亦可去毒收口

蜜陀僧 即鉛 製法 先以鉛入鍋煮熔用鏟再燭令與天空養

氣相合變作黃粉 即黃 隨將該粉撥出復用烈火煎過俟令凝

結卽成爲蜜陀僧

是日蜜陀僧原國有諸言用法提其藥目所名蜜陀僧也

形色

作魚鱗形返光色棕黑而略紅

氣味

無臭無味

溶化

清水難化不入服劑

製膏藥方

蜜陀僧

三斤研至極細

白欖油

一百六十安士量或用生油亦可

清水

七十安士量

先將欖油放入銅鍋次以蜜陀僧末篩入頻頻攪動然後加入清水用火煎四點鐘煎時亦宜頻攪若太稠則再加水以煮

至恰可成膏爲度以布開調

通用

可作合口膏用若和入別藥作膏尤爲通行

辨謬

時珍本草謂其能鎮心補五臟治驚癇欬嗽嘔逆吐痰

西藥畧釋

卷四

雜述

蜜陀僧

合口膏

五

而且久痢瘡疾均能療治正未必有此妙用也

合口膏

製法

蜜陀僧膏

二十兩

松香

三兩二錢

番釀

一兩六錢

先將蜜陀僧膏煇熱另以一鎗將松香番釀煮熔然後加入蜜陀僧膏和勻 此膏宜以布開調凡割症用以合口甚妙

收口膏

即俗名埋口膏

製法

蜜陀僧膏

廿七兩

番釀

四兩八錢

松香

八錢

宜照上法製之製成後用布開紙開調均可 凡瘡科及皮膚等症不能收口者以此膏貼之

石膏

此物實經細覈乃鉅養礮養加水也煨之則所面之水

化散而成白粉，卽熟石膏也。煅煇中度者，再和以水，則能堅凝如石。故或以作脫胎鑄模。此生石膏水化極微，一若全無化動，卽以^三五兩煎服入胃者，亦止些須，且無舍利酸力，亦無發吐攻瀉之能，只合作器，不堪入藥。

辨謬

時珍本草謂其能治中風及傷寒發狂、風熱心燥，凡一

切頭痛、腹痛、牙痛、胃熱、肺熱、身熱，均能療治。此皆浮泛之詞也。

秋石

此物覈得內函尿酸尿底，及鉅養之質，間或兼函綠氣，殊無功用，服之未免損人。

辨謬

時珍本草謂其能治虛勞冷疾，小便遺數，漏精白濁，而

且滋腎水養丹田潤三焦安五臟消痰退蒸清心明目益壽延年實不知何所據而云然也

陽起石

此物內函鎂鈷鐵養玻酸等質別無功用不堪入藥

辨謬

時珍本草謂其能補腎氣而所有精乏腰疼膝冷溼痺

月水不定子宮久冷均能調治均非確實之詞也

赤石脂

此物內函鈹炭養別無功用不堪入藥

辨謬

時珍謂其能明目益精補心血生肌肉除水溼收脫肛

誠未必然也

大楓子



大楓子

產印度孟咖喇等處樹身高大枝細莖繁茂樹皮灰色光滑葉長五寸至八寸葉蒂圓而未尖銳葉非對生參差

而出葉面潔澤底有粗紋微凸其花開五瓣有香氣鬚蕊紛
然生於嫩枝近丁托處果圓大橫徑約三寸皮色灰粗澀厚
硬果內子核甚多每顆長約一寸子面有油搗爛搾取其油
用功力全在於油也

功用 內服外治均有功效

主治 風溼症以此油擦患處見效 凡風溼症宜於夜間

初次服五滴以次漸加至十滴宜飯後不宜空腹 扭傷

跌打骨絞作痛每日用此油擦之數日見效 此油可助

開胃服後宜吃好物調養爲妙 內傷症每日服兩次初

服五六滴 腦筋痛用此油和樟腦末或和黃蘗方擦患

處可止。多年頑惡癰疥，以此油搽之效。印度地方有麻瘋症，用此油內服外搽，往往見效云。

考訂

查本草綱目能治大風疾。又以仁研極爛，瓷器封

口入滾湯中，密蓋勿令透氣，煎至黑色如膏，名大風油，可
以和藥，氣味辛熱有毒，主治風癰疥癩楊梅諸瘡，攻毒殺
蟲。震亨云：此物性熱傷血，不可多服，有病將愈而先失
明者，未知確否，然內服當搏節而善用之，爲佳也。

一、
二、
三、
四、
五、
六、
七、
八、
九、
十、

一、
二、
三、
四、
五、
六、
七、
八、
九、
十、

一、
二、
三、
四、
五、
六、
七、
八、
九、
十、

調養製藥總論

人徒知貴重之物爲有用。而不知無用之物更比貴重之物爲有用也。觀用啍先雞。噉汁等。以療各症。則知古名醫以牛。溲。馬。勃。皆成良劑。誠不虛也。人徒知藥石刀針以治病。而不知不用藥石刀針之治病爲更神也。觀用牛奶。牛羊肉。雞湯。蛋酒。杏仁。薏米。初。高辣等。調和戒口。而起衰羸。則知古賢士以平和爲丹。汞節食。當中醫良有以也。人徒知飲食以養身。而不知錯用其物。卽可戕身。善用其物。有非藥石之可能及者。古訓有云。人死於刀兵。飢寒者常少。而戕於衽席。縱慾者常多。如醉飽。宣淫。五臟傾覆。遠行勞悴。一頓飽餐。皆戕生之禍。亦如大道祇在日用。

倫常之間。而不知自檢。反登山涉水。而訪求於杳渺之際。是舍
近圖遠。厭故喜新。如猶太狂且。日對至人。尚求自天奇蹟。噫。好
奇至此。離正愈遠。無怪仲尼不述索隱行怪之事。爲萬世防微。
亦深切著明者矣。吾喜西醫論治病。善用飲食一節。有合乎中
庸。至平至正之理。可以傳後。而無疑。至煎熬藥膏。一可省運費。
一取用精液。誠爲便捷。何以川滇產藥之區。迢遙萬里。胡不做
而行之耶。卽此一節。足覩誠僞之分。遠近西國。今之藥販。有形
可考者。尚且千般作僞。愈出愈奇。致不可窮詰。況熬膏製酒。而
可信之乎。吾亦恐西來之藥。日售日多。或將來假手於傭販。射
利之徒。倘一旦纒雜亂真。則所關非細。是亦不可不預爲之防。

也。華扁之妙技。俟人而傳。亦恐其習之不精。以人命爲戲玩。有非草木湯劑可比者。更不可不知也。

神宗

卷四

七

論初高辣

此樹生於南美利加墨哥西等處高三四丈葉如

梨長五寸葉下垂略凸如乳頭肉鬆味甜藏核甚多取核晒干或焙味略苦澀其新焙者用箱貯藏地內兩三日則苦澀味盡去核形扁類卵長四五分色紅櫻或灰櫻不等核之邊欄有凸線痕一條核內有油每百分中有油五十分有漿約十四分至十八分有輝晬連之類十三分至十八分餘屬雜質

一取油之法

將核杵爛上下鐵板二塊燒熱壓榨以取其油

卽名加加阿

一凡初高辣菓核杵研爲末照重加白糖和勻做成方長條或圓餅炖熱牛奶調和食之有益

一凡不能飲茶葉及咖啡者以此代之

一病人初進飲食時用牛奶和食最爲有益

一油色白略黃凝結恍如猪脂手掌之熱可化味與核同伊打

酒或熱火酒皆能化

一以輕重表探之水一油二零九輕於水故浮水面

一功同魚肝油可潤肺補肺

一用製膏藥治瘡科傷損俱效

一可和各等藥散以器具製成條納入肛門最爲通行之用也

論俾先 此乃由猪肚內皮發出之汁

製取之法

一將猪肚內皮用塩強水加生塩少許汁自結珠

一將肚內皮洗淨用象牙刀用力刮之則汁自由肚內之核而出然後薄放於玻璃片上以熱水燄乾或用熱氣焙乾不可過寒暑表百度

一方 糖開者可服八釐半至一分七釐甘油開者可服五分至一錢無有用酒開服者

相反 蛤利類 各等強水 水銀鉛錐銅所製炭匿酸加泐酸

相畏 火酒 各色酒類皆可敗其功力

相佐 奶酸 塩強酸 醋強酸 檸檬酸等 甜肉汁 酒種

功力試驗

以凝結熟蛋白二錢投啤先汁一分七熱至一百

度四點鐘至六點鐘自可化之其功用消化有淡氣食物如牛

乳餅雞蛋各肉類皆是

論治病用法 凡胃不消化因舒縮功用改常者加鹽強酸內

傷或肥膩停滯者加甜肉汁服之 熱症將愈服此助胃消化

不至弱極也

奸沙毒瘡小便有糖成消渴及心部各病服之皆效 小兒乏

乳食乳餅充飢養服晚先可免停滯不化 作散小兒飲乳或

食物後開糖水服十滴至十五滴功效同上 孕婦作嘔服之

效 凡食後停滯腹脹或苦痛難忍服之立愈 血痔紅珠滅

少與水服之能消化生新血。胃癰毒瘤服之止痛。胃癰常有服之而愈者。毒瘤雖不能愈。得此以助消化養身。亦可延年。能止小兒瀉利。調攝小腸內皮。凡小兒泄嘔。多因胃內消化不盡。或腸胃之間乳食停滯。泄嘔日久。必瘦弱乾枯。每飲食後服啤先少許。最爲有益。

論外治用法 割症後或要害處傷重。食不下咽者。宜以牛乳牛肉汁等和啤先射入糞門以養之。啤先加些鹽強酸。以小水節射入瘡瘤之內。若屬脂瘤。雖不能拔去患根。亦可隨時內消耳。

論雞嘔汁 功用止嘔理胃。凡胃不消化。與腸胃有風。胃內皮

發炎俱效，孕婦作嘔則屢經效驗，性純不至令胃不舒，但助消化者，宜飯後服。每服八釐半至三分半。

論猪牛甜肉汁 此汁專助大小腸消化，多食肥膩者尤宜相反同嚙先

論燐質所製光藥之法 燐質透光，體堅無色，有蠟質之無味，聞之又覺氣臭異常，其重數一零八。

製光藥油方

燐質 二分

杏仁油 一安士

量

每服五滴至十滴

又方

燐質 八毫

魚肝油 一安士

燐熱開之每服一錢

製光藥丸方

燐質 一份

羊油 一百份

和合爲丸每粒以五釐爲度

製光藥酒方

燐質 一厘七

淨火酒 五錢

甘油 一安士

燒酒 二錢

薄荷酒 五分

先用燐質放火酒內至微熱再以燒酒甘油攪勻熱甚俟冷時

再入薄荷酒每服大半厘至十厘七

製伊打光藥酒方

燐質

伊打酒

以酒開勻每服五滴至十滴或以哥囉方或磷炭開燐質亦可

製鐸燐養方 用玫瑰膏製為丸者佳每一厘分五次服至每服八毫

相反 鎂養

石灰水

炭灰

松節油

凡經久走味之松節油或尋常所製內有阿純多者尤與燐相反

相佐 油類

信石

硫磺

信石大助硫磺些少

油不可多用

凡造火柴若以小樽載松節油掛於項下可免其毒或浸以松

節油、燐光滅燭。此物性相制、自然之理也。

附論解毒換血之法。凡解救服毒人、皆知嘔盡爲佳。故吐藥

中銅磺、爲最妙。然燐銅相合、不若專用燐質尤猛。凡用銅磺、
養大嘔之候、卽應以鎂養。或平常松節油解之、血若已經受毒、
則宜用法借取、別人之好血、運入其迴管、以換之事。雖創而實
妙、不可畏難苟安也。

藥性功力。平人試之、覺眼明、角罩及氣管內皮皆改常。藥主
暖胃、所發內多輕氣。覆有輕燐氣、蓋入胃則胃不安、且令心跳。
身畧熱、心脈氣力有加、血壯。少婦月經倍多、慾情難禁、汗溺皆
多。若過服腸胃液多受患、故肚痛嘔瀉皆作。其性峻烈可見。故

少少參以油質服則由胃入血尙無大碍。否則大損血內紅輪。身體必然虧削。是以旣受燐毒。必須改換血脈。或如上文所云。借取別人之血。射入迴管。乃可得救。不然則輕燐氣。寓內熾盛。壞却血內紅輪。臟腑內皮。皆發水。隨卽胃肝心部。與及脈管皆腐變成油。久則肌肉亦然。有胃服燐質後。見流血不止者。此必其脈管腐變成油之候也。見生黃者。乃肝體成油之候。○製造燐質各物。常受其毒者。多有牙床骨朽。或骨衣發炎。腫痛等患。不可不知。○至多服起譟語。癱瘓。昏迷不醒。及抽筋等患。則毒竄腦部之故。用此可不慎歟。

論治病用法

上文已詳其能壯心脈。則凡腦部失血。身弱血

華者服光藥丸酒大有功效較之緣養冰飯誤服後令人思睡者此則異是惟用得其法亦可令腦之功用得復如常故凡失養疴羸衰耄遺忘手足發抖等患服之極有功效○少年心思無力兼腦脈管生粉瘤腦部失養者少少用之極驗老年患此宜加魚肝油曾見用此二味治愈癱瘓者必須按時少少服之日久無間必見功效切勿多用多則無益反致危險倘癱瘓日久腦內白漿已壞則燐質甚妙石燐乳尤佳初起者亦不宜用也○論治腦筋痛或謂多服乃可見效然究竟不可太多蓋一厘分七次服亦無不足即光藥酒一錢內亦約含燐質如是而已○羊弔頭昏腦筋痛因過用心腦之力者陽痿非因疔毒者

筋痿行動不穩，脊髓變石質等，少服之甚效。○皮膚酒滓，亦可用以代信石酒，滓發小膿瘡，尤良。

論磷質及所製之方劑

鎔鈇鐵

磷蓋

和勻糖水開，每服可一錢至二錢。

石質乳

磷蓋

和勻糖水開，每服一二錢。

論石磷蓋藥性功用

人之週身，皆有此質，骨骼藉以堅立，若

幼齡骨未長定，此質太少，則骨軟，稟受成胎無此，則不能成骨。飼牲畜類，少石磷蓋，則骨軟，且不但骨內有此，血液胃汁乳溺

皆然洵屬養身之最要而不可少之物也。○此藥入胃自可入血少服則可除感霉毒各症外切宜少用多則胃不受納且令腸液生多泄瀉而出每服一厘七至一分七厘

論鎬燐螽藥性功用 清水一錢可化此藥四厘服後自散入血服至一安土則輕瀉味鹹如塩於飲湯吃粥時用以代鹽味甚佳功能增血內蛤利類○服多則消化既阻發尿酸而令溺短且瀉後胃腸皆覺不安必稍有碍於消化故宜少少服之如用以治霉毒各症而非瀉者則無關於胃腸且用之合式反能去胃腸內皮之病焉

治病用法 凡頭痛症或因肝膽受病而致或因胃腸內皮發

炎所致以鎬燐蓋瀉之極其效驗久服戒口合宜永無再發之理蓋鎬燐蓋能解其炎也○黃疸症亦由胃腸內皮受熱以致肝管發炎每服一錢日服三四次奇效若小兒常犯此症者則不宜大服至多不過一分七厘至三分半可也凡膽淋症因大腸上迴發炎累及肝膽亦炎至肝內膽汁凝結生膽淋者則鎬燐蓋極妙其功力可免肝汁發稠及止肝管內皮炎痛每服一錢飯前空腹服數月自可斷根

助小兒膽汁消化凡小兒多病身體失養糞下如米泔水面青白皆膽汁少雖胃尙好飲乳多急用鎬燐蓋一分七厘和乳一小盃日服數次自可增其消化之力則膽汁日多養漸黃體漸

壯矣 健骨生齒 凡身體欠養、骨痿、骨斷、不能復元、幼年牙齒離落、與及腐骨等事、必須用此軟者復堅、離者漸合、

助乳母生血 凡乳母被兒吸久、乏乳、血薄、身弱、石燐齋加

乳酸極其有益

瘡癰善後 膿瘡、背癰、日久不愈、流膿過多、及身弱、氣管、內皮

發炎、咳嗽、多痰、流白帶等類、皆宜服上二藥、以培養其身、病無

不愈矣 舊症有益 論內傷舊症、如肺生嚙、吡、咖、壞體、及氣

管腫大、用石鈉、鋏、鐵、合、燐、齋、開、糖水、甚為有益、新症不宜蓋能健胃

扶羸、以冀延年之助、倘於胃不合、如服燐齋、合各雜質、開糖水

而見腸痛者、又需調劑而用之、宜以燐養酸、合各雜質、可免此

患

一方

鐵石二質與燐螞糖水開化

三安半

燐酸半安土淡者

和勻 每服一錢日三服內傷舊症尤宜加魚肝油

飯前空腹服

一方

石燐螞

糖水開化 四安土

信石水

一錢

和勻 每服二錢日三服

輕燐螞

製法

以燐人油加養氣淨而乾者良

論炎症熱症應食之物

凡身熱未退，病勢遷延異常，食物最

宜戒慎，其腸脂耗却，消化無力，肌瘦面白，氣弱聲微，納入糧食，

或停滯或反常，或食入不受用，或化不淨，入血無益，血脈亦因

而改變

紅輪少而血絲多，血絲西名輝啤連

不能將應去之雜質隔出，小便短少，

色深，內有尿酸尿底，惟鹽類則少，或無，蓋有發炎，則全聚於炎

處，尿所函之燐雜質甚多，是以尿底更盛，身內各質體皆漸變

漸壞，熱愈熾，養身各質體因之耗盡，故日瘦而日衰也。凡非飲

食經由之路發炎

食管胃大小腸

則可用牛奶稀粥，按時少少而進，度

其化盡乃可再食

大約每三點鐘一次為度

若欲多食牛奶，或食後胃覺不

舒，則加石灰水或對半，或四份之一新鮮牛奶，於大熱症最宜

可以此一物爲養命出紅痧熱症亦然蓋牛乳可養身亦可利

小水

紅痧症小便不利則甚危

牛肉湯亦屬可用但畧難消化究不如牛乳之有益嘗見大熱症服牛肉湯下後仍不轉化者則屬無益更有以牛肉湯俟冷成膏以食者尤屬盲昧無知夫牛肉湯冷則成膠類更難消化何能養身乎

炖牛肉湯之法

去淨筋膜油脆骨之精牛肉十二兩切碎以

冷水一升浸兩點鐘慢炖三點鐘

火候不可過寒暑針一百六十度

水漸乾漸

加冷水炖好仍得湯十二兩牛肉十二兩之數用布濾隔每次

飲一茶杯凡症初起者宜

羊肉湯 淨腰脇肉十二兩去筋骨以水三十六兩慢火炖至極透加鹽葱至合味倒放碗內至冷撇去上面之油若嫌冷復煖之良

鷄湯 嫩鷄一隻半大者良宰淨去皮切碎連骨烹煮加八角一二枚薑一片水二十四兩烹一點鐘湯面油隨卽撇去極清貯碗濾淨可飲

以上各肉湯宜加入猪牛肚汁卽啤先或鹽強酸或乳酸可助其消化自能生血養身誠大益也或以牛肉切碎入白杵爛去淨肉絲取汁加酒功用與湯同

牛乳酒 鮮牛乳二十四兩入鍋煮至將沸卽加酒再烹一刻

撇去稠汁加酒一小杯復撇去稠汁可飲

蘇仁茶

蘇仁

成個者佳

八錢

白糖

八錢

甘草

四錢

檸檬汁一兩六錢

滾水廿四兩

熬四點鐘將甘草渣隔

去良

薏米湯

薏米一兩六錢冷水洗淨以清水煲約五咪呢之久

將水去盡另以清滾水四十八兩復熬至二十四兩加檸檬皮

糖少許勿去渣臨飲欲隔乃隔不隔尤妙

除以上各湯水之外其餘炎熱各症可用者亦不外牛乳半

生雞蛋等類之物

甜牛乳酒

牛乳十二兩煲滾加酒三兩二錢鹽淨加糖其味

既甜而不酸亦稍有養身之力

牛乳蛋酒

鮮牛乳煲滾入瓶放在滾水鍋內炖之

勿至瓶內牛乳滾沸

畧久提起俟冷將一蛋打入一大茶杯加糖打勻至白黃混合

如沫再加酒二錢同傾入牛乳瓶內可也此與牛肉湯間換而

飲一次飲此一次飲牛肉湯

炎熱症飲之均益惟必相間而用不可於三點

鐘內飲之至再○欲將牛乳蛋與各酒和食者可照下文製法

新鮮牛乳入一瓶內酒一盃加糖少許和勻入瓶牛乳不

可煲至滾

蛋酒

以瓶貯濃酒小許

淡酒則可多些

雞蛋一隻打勻沙糖半

匙清水八錢和勻放入酒瓶內未起油即飲之良

以上各物炎熱症初起時擇而用之獲益不淺耳

論腸胃症應食之物 胃腸病症不拘新舊皆宜以牛乳去皮

為養生之糧舊症更宜已於胃腸病治法內詳明誠至美之法也然

有時祇胃或腸起病未久者凡易化之物如牛乳加石灰水白

粥薏米湯酸子牛奶水加播粥檸檬水與及檸檬水等物皆可

食之

薏米湯

薏米 四錢 清水洗淨

檸檬皮 一塊

沸水 二十四兩

白沙糖 一匙羹

新檸檬 半個 榨汁

沖浸七八點鐘瀘而飲之良

加播匿檸檬糖

檸檬

兩個
搾汁

山水

十二兩

白糖

一大匙

每服一碗加一小酒盃鎬炭羣和勻飲之益

胃舊病消化功用已失，內非真津液，凡有淡氣之物則不能化，如飯藕粉、米粉、馬蹄、麪包、青菜等類，多賴小腸助力，久之皆不能化。

胃釀酸水，或灼熱病原多，食漿油之物而起，膏粱應行痛絕，可食者惟酸菓、青菜、酸酒而已。

小腸不消化，暑天泄瀉，或小兒嘔瀉，所食者皆宜入胃卽化，以

令腸得安息勿動也膏粱之物皆宜戒絕原漿油之物在胃不能化盡必待小腸以化米麪各粉薯芋荳及牛羊豬等肉皆不宜食絲各物內面有漿油胃既不能化盡其病轉增至患處則極不舒焉每見暑天小兒多泄瀉者莫不由此之故

膽管發炎與膽汁入血而成黃疸者凡有漿有油之物皆不可吃能令肝管發炎增劇近大腸上且油類能令膽液精凝結膽汁實厚也痢症日久者宜食菩提子汁桃子蕃茄芹菜椰菜等類嘗有小兒久痢偶食桃子和牛乳而愈者亦一奇事也大便秘結者則戒口爲尤緊要蓋此必腸內津液枯竭或腸失功用宜食麪菜青菜每日食杏仁葡萄子乾各六枚或可通潤耳

大便下血或因腸部大迴管積血或因秘結而致者則菩提子甚妙而青菓青菜常吃亦佳

論身弱人應食之物 凡有病之幾而病勢未形于外者最宜預爲調理或曾經受病過用涼削之藥以致元氣虧損胃口不舒精神困乏寒暑馳勞俱不能耐弱質牽纏跬步食息不同平人無所顧忌也必須多用煖炭二氣之物以堅其肌骨壯其體膚夫脂膏在人身與在各畜身內無異故猪牛羊肉之脂油及花生生乳等油成人之脂膏居多糖或菓子青菜次之卽米麪薯芋有漿之物入胃亦能化而爲油酒亦生脂膏之助宜於婦人畢竟牛乳尤佳乳婦乏乳食粥及牛乳可令乳多油能長脂

肉能壯肌骨皆屬自然之理凡瘰癧症受水銀毒症鉛毒症疔毒症受濕體弱與及內傷等症則肉食宜之

骨軟症

宜多食內函石燐、蠶及各燐、蠶雜質之物兼飯麵粉

等○風濕脚腫宜食飯青菜酸菓肉食不合

小便內含糖症

即俗名下消症

治不治全在戒口一端凡有糖之物

與生菓青菜及麵食皆不相宜極宜戒絕甚至米亦可化為糖
少吃乃可凡麵包薯蕷一切生菓青菜中可食者祇番茄芹菜
椰菜而已有油之物如花生油白欖油魚肝油猪油牛奶油等
皆可食牛羊猪肥者尤佳

納物入肛門以塞之 夫人不食則死然當胃病至極不能受

物不得不用此以濟醫術之窮而延生命於旦夕所謂別開生
面想出非非者歟蓋遇胃生毒瘤則不能化物亦不宜動食管痛
胃痛胃受傷等皆同然須明白肛門非消化之府所納入之食
物必須自化或已爲人力所化者乃可又須知肛門內滯水皆
屬蛤利類所用必酸味乃合此又化學之功也○牛乳照上文
煎法四安土加^淡酸十滴豬肚汁二錢和勻射入肛門若覺不
舒則加鴉片酒十滴至二十滴加酒少許更有功力初雖不覺
多次必不能忍此時射之者須小心輕輕而試不可一時脹逼
太甚更不可納之過頻每日夜祇可五次而已蓋食物爲火力
所化究不如在胃自化者行運之速也

論皮膚症應食之物，蓋有兩端，一消內積，一清外患。皮膚各患，常因多食不化而起，故戒口以牛奶作飯餐，一法多獲奇效。○又或多食漿糖油之物，因而胃內釀酸者，亟宜去之。凡虛弱血薄，則非兼淡炭二氣之物，不能爲功。而平日嗜肥膩者，尤非此不能消去也。

西國煎熬藥膏以用一省運費一盡取藥之精液其法詳下

用新鮮藥草或莖或根或枝或幹或皮或囊或子洗淨搗爛搾取漿汁用火熬滾隔淨其滓煎至藥水成稠汁此法祇可用於甬水多之植物乾實者難以取汁不可一概而

論

西國製藥酒法

用藥研末

十二兩
八錢

以火酒浸溼一點鐘置漏

斗內漏斗有磁器有洋鐵倘藥末屬輕鬆者不必過實屬乾實者加意四圍築實切不可一邊實一邊鬆先用布罩住少頃撤去用酒加入至漏斗底流出爲度先後約十六安士上下塞蓋完密俟兩日或四日去下塞再加酒連前要重二十八安士流

出之先用一玻璃貯之以十四安士為度

先將樽量重到樽身某處是十四安士貼記為號

另用一玻璃貯十安士者亦如前法量準貼記為號倘酒耗去不足十安士要續加淡火酒至將盡時再加些水收足十安士酒入樽後要煎去八安士剩回兩安士可放人前樽十四安士之內共湊十六安士耳再過一二日藥渣澄定將上面清的入落別樽及後有些略濁的用布或用紙隔過方可此法用水或用火酒均可從前用淡火酒近來俱通行用火酒耳

漏斗圖附

凡用藥治病應用某藥重八錢者即用此藥

酒一水

安士應用藥一錢者亦用藥

酒水

二錢可也

伊打酒製藥之法須另用一器具因伊打酒能飛去故器具不

同用藥，不過數款，不復再詳。

又一法：照上文製成藥水，或藥酒，十六安士之後，仍可煎熬成膠者，用一闊口淺鑊，或磁鑊，或白鐵鍋，載藥酒，或藥水，於內，另用一闊些的鍋，貯滾水，置藥水鑊於滾水之上，不用蓋，以慢火熬之，熬至藥水稠時，不住手攪勻，或煎至水汽去盡，成硬體者，或為藥散，亦可，或煎至略軟，可為丸者，但不拘軟硬，要留心火候，不可粗率，煎成藥性氣味仍存，斯為得法。用隔水鍋以炖之者，可免焦焙之氣息。凡煎稠膏者，當以此為穩妙之法也。

製顛茄膏方

新鮮顛茄葉及嫩枝一百一十二磅，用大石臼

搗爛，搾取其汁，煎至一百三十度之熱。

係用二百一十二度表

以綿布濾

西藥畧釋

卷四

顛茄膏

甘草水

合

淨用隔水鍋煎去水汽煎至糖膠之稠將初次青色濟放入再煎用木片不住手攪勻煎至僅足一百四十度之熱便可不可過此稠至可以埋九爲度此乃英國通行之法

製甘草水方

用粗甘草末

十二兩

清水

八十安士

先用清水

四十安浸甘草末十二點鐘隔淨搾盡渣內之汁又用清水四十安浸渣六點鐘隔搾淨盡將兩次甘草水煎沸至二百一十二度之熱絨布濾淨用隔承鍋煎去水汽略稠以探輕重表探之水一甘草水一零一六每甘草水七安士加火酒一安俟十二點鐘再隔以絨布貯樽內此水味甘乃甘草原味咳嗽可用或調和苦藥水亦可

終

新
百
科
全
書

CATHARTICS.

Manna
Sulphur
Magnesium
Magnesium Carboate
Oleum Ricini (Castor Oil)
Magnesium Sulph (Epsom Salts)
Magnesium Citrate
Sodium Sulph (Glauber Salts)
Sodium et Pot Tartrate (Rochelle Salts)
Sodium Phosphate
Potass. Bi-tartrate (Cremor Tartar)
Potass. Boro-tartrate
Potass. Tartras
Hydrarg Chlor Mitis (Calomel)
Pilulae Hydrarg
Hydrarg C. Creta
Rhubarb
Aloes
Aloine
Senna
Jalap
Extract of Jalap

壹卷	
篇四罕	論藥瀉
七十四	拏嗎
上同	磺硫
九十四	養鎂
十五	養三炭鎂
上同	油麻飽
一十五	硝朴洋 養四磺鎂
三十五	水檸鎂
上同	粉明元 養四磺鎂二
五十五	鹽葡鎂
六十五	養三磷二鎂
上同	散酸葡鎂
七十五	散酸葡硼鎂
上同	鹽葡鎂
八十五	米路迦 綠汞二
一十六	丸藍汞
二十六	粉汞石火
三十六	黃大
四十六	囉鴉
六十六	精囉鴉
上同	拿新
七十六	笠渣
上同	膏笠渣

Scammony
Extract of Scammony
Dolocynth
Podophyllum
Gamboge
Oleum Tigllii (Croton oil)
Claterium
Enema

EMETICS.

Apomorphia
Ipecac
Lobelia
Mustard
Tartar Emetic
Zinc Sulphate
Copper Sulphate
Potass et Alumen Sulp. (Alum.)

DIURETICS.

Potass. Bi-Tart (Crem Tartar.)
Potass. Acetat
Potass. Carbonate
Potass. Bi-Carbonate
Potass. Citrate

篇八李	尼無金士
上同	膏尼無金士
九十六	新囉哥
十七	連非道布
一十七	黃藤
二十七	油荳巴
三十七	爹禮衣
四十七	法門肚入射水藥用附
二卷	
篇一	論藥吐
三	啡麼甫阿
四	格畢衣
六	利卑路
七	末芥
上同	散吐葡銻鈦
十	養四磺鐳
二十	礬胆養四磺銅
三十	礬白養四磺鈦銻
四十	論便小利
五十	散酸葡銻
上同	鹽船銻
六十	養三炭銻
八十	養三炭雙銻
上同	鹽檸銻

新	Ammonia Acetate
西	Buchu
藥	Colchicum
各	Turjentine
單	Copaiba
▼	Spirits Nitrosis Dul
卷	Cubobs
一	Squill.
目	Scoparias (Broom)
錄	Uva Ursi
	Juniper
	Dandelion
	Digitalis

DIAPHORETICS.

Jaborandi	230
Pilocarpin
Potassa Citrate
Ammonia Acetate
Potassa Nitrate
Dover's Powder
Ipecac
Tartar Emetic
Guaiacum
Sassafras

上同	水鹽醋淡輕三
九十	咕標
十二	噤枝哥
一十二	油節松
四十二	把拜哥
五十	酒打伊硝甜
六十二	茄澄畢
七十二	釐上十
八十二	花雀金
九十二	些兒巴嬰
上同	子格
十三	英公蒲
一十三	黃地手
二十三	論表發
三十三	的墨波午
上同	偏加魯排
四十三	鹽榨銀
五十三	水醋淡輕三
六十三	養三淡銀
八十三	散表片鴉
上同	格畢衣
上同	散吐葡銻銀
八十三	噤厄主
十四	法沙沙

奴	Peppermint
茶	Sweet Spirits of Nitre

EXPECTORANTS.

美	Seneka
樹	Squill
金	Assafoetida
花	Garlic
花	Cimicifuga
養	Ammoniac
養	Benzoin
養	Myrrh
一	Balsam of Peru
一	Balsam of Tolu
着	Tar
着	Ipecac
確	Liquorice
確	Tartar Emetic
奴	Copaiba
奴	Ammonia Chloride

ASTRINGENTS.

道	Uva Ursi
手	Gall Nuts
留	Tannin
公	Gallie Acid

上同	荷薄
上同	酒打依硝甜
二十四	論痰化
四十四	加衣辛
上同	釐主士
五十四	魏阿
七十四	頭森
八十四	思米
上同	懸麼阿
九十四	香息安
一十五	藥沒
二十五	漿魯秘
上同	漿魯到
三十五	油嗎把
上同	格畢衣
上同	草甘
四十五	散吐葡銻鉞
五十五	把拜哥
上同	綠淡輕四
九十五	論藥歛
十六	些兒巴要
上同	子石沒
一十六	霜子石沒
三十六	酸渤架

增
已
身
采
名
二
目
金

Kino
Catechu
Ext. of Logwood,
Krameria Rhatany
Oak Bark
Rubus Fruticosus
Pomegranite Rind
Acetate of Lead
Liquor Plumbi Diacet
Alum
Bismuth Sub-nit
Bismuth Carbonate
Cereum Oxalate
Zinc Acetate
Zinc Oxide
Zinc Sulphate
Copper Sulphate
ANTHELMINTICS.				
Chenopodium
Santonin
Spigelia
Pomegranite Rind
Aspidium (male fern)
Pride of China

四十六	奴佳
上同	茶兒
五十六	水蘇洋
六十六	喇美架
上同	皮樹櫟
七十六	子鈎懸
上同	皮樹榴石
上同	精鉛
八十六	水醋(養鉛)
九十六	礬白
十七	養五淡養四鈹
一十七	養三炭鈹
上同	鹽西惡金
上同	鹽醋錫
二十七	養錫
上同	養四礬錫
三十七	礬胆養四礬銅
四十七	論 蟲 殺
五十七	褒奴芝
上同	年道山
六十七	喇士拜士
上同	皮樹榴石
上同	安必亞
七十七	子棟苦

Brayeria Rottlera
Melos Seeos Pepo
Kamelia
Turpentine

TONICS.

Chalybeate Tonics
Ferrum Oxidum Hydratum
Ferri Sub-Carbonas
Ferri Carb Sacch
Ferri Magnectic Oxide
Ferri Sulphas
Ferri Phosphas
Ferri Pyro Phosphas
Ferri et Potass Tartras
Ferri Citras
Ferri et Quinia Citras
Ferri et Stryenniae Citras
Ferri Chloridum (Perchloride of Iron)
Tinc Ferri Chloridi
Ferri Iodidum
Ferrum Dially
Jinchona Bark
Jinchona

八十七	蘇哥
上同	核瓜南
上同	喇微記
九十七	油節松
三卷	
篇一	論藥補
二	劑鐵
上同	散溼養鐵
三	散養三鐵二
上同	散糖養三炭鐵
四	粉石鑷淨
上同	鑾青養三礪鐵
五	養五燐二鐵
上同	養燐火鐵
六	鹽葡鈇鐵
七	鹽檸鐵
上同	片檸拏桂鐵
上同	鹽檸尼的士鐵
八	水綠鐵
九	酒綠鐵
上同	碘鐵
上同	水養鐵綠鐵
十	皮樹衲雞金
一十	拿高先

Quinita	上同	打呢桂
Cinchonita	二十	打呢高先
Quinia Sulphas	上同	養三磺拏桂
Quinia Bi-Sulphas	六十	養三磺雙拏桂
Quinia Murias	上同	綠輕拿桂
Quinia Acetas	七十	鹽醋拿桂
Quinia Phosphas	上同	養燐拿桂
Quinia Salicylas	上同	先泐沙拿桂
Quinia Argenias	上同	養信拿桂
Quinidina Sulphas	上同	養三磺打呢桂
Cinchonidinae Sulphas	八十	養三磺打呢高先
Quassia	上同	沙瓜
Bear's Gall	上同	草膽龍
Calumba	九十	筍林加
Chiretta	十二	大利介
Wonglin	上同	連黃
Wild Cherry Bark	上同	皮李郁
Willow Bark	一十二	皮樹柳
Cinnamon	上同	桂玉
Cloves	二十二	香丁
Calamus	三十二	蒲菖水
Orange Peel	上同	皮陳
Ginger (dried)	四十二	薑乾
Zinc Sulphate	上同	養四磺錳

Silver Nitrate	五十二	養三淡銀
Acid Sulphuric	六十二	酸養三磺
Acid Sulphuric Dilute	上同	水强磺淡
Acid Sulphuric Aromatic	上同	酒香强磺
Acid Nitric	七十二	酸養五淡二
Acid Nitric Dilute	上同	水强硝淡
Acid Muriatic	八十二	酸綠輕
Acid Nitro-muriatic	九十二	水强皇

STIMULANTS.

(a) Of Spinal Cord & Sympathetic

Electricity	一十三	論氣血行
Nux Vomica	上同	筋腦和自及髓脊行中
Strychnia	二十三	氣電
Picrotoxine (Cocculus Indicus)	三十三	鼈木番
Ergot	四十三	年的士
Maize Ergot (Ustilago Maedis)	上同	先度路逼
Digitalis	六十三	葛丫
Belladonna	上同	葛丫米粟
Atropia	七十三	黃地毛
Stramonium	九十三	茄顛
Hyosciamus	一十四	邊刀丫
(b) Of Cerebrum	二十四	兒茄佛
Camphor	三十四	花羊鬃
Assafoetida	上同	筋氣腦大行乙
	五十四	腦樟
		魏阿

Valerian
Serpentaria
Cannabis Indica
Eucalyptus
Coffee
Caffeine
(c) Of Circulation and Brain
Alcohol
Wine
Malt Liquors
Ethers
Ammoniae Carb
Preston Salts
Spirits Ammoniae Arom
Turpentine
Heat
Steam
Steam Bath

ANODYNES.

Opium
Opium Habit
Dover's Powder
Tinc. Opii Camph.
Vinum Opii

上同	松甘
六十四	釐班士
上同	喘咧加
七十四	沓列加
十五	啡咖
上同	烟啡咖
上同	氣腦及血行 丙
上同	酒火
三十五	酒提菩
三十五	酒啤
上同	酒打伊
四十五	養三炭淡輕四
五十五	法鹽香作
六十五	水香淡輕三
上同	油節松
七十五	氣火
八十五	法薰水熱
上同	法汽水熱
十六	論 寧睡 痛止
一十六	片鴉
六十六	語評片鴉
七十六	散表片鴉
八十六	酒片鴉腦樟
上同	酒提菩片鴉

Sure
Acid
Acid
Acid
Acid
Acid
Acid
(a)
Elec
Nux
Sery
Pie
Eng
Maiz
Dig
Belle
Atro
Sira
Hyo
(b)
Can
Ass

Tinc. Opii, deodorized
 Morphia
 Morphia Salts
 Morphiae Sulph
 Morphiae Murias
 Morphiae Acetas
 Codiae Sulph
 Chlorodyne
 Hoffman's Anodyne
 Chloral Hydrate
 Croton Chloral Hydrate
 Potassae Bromide
 Alteratives Promoting Waste
 Mineral Springs Alkaline
 Mineral Springs Saline
 Ammonium
 Ammoniae Carb
 Ammoniae Valerianas
 Ammoniae Phosphas
 Aqua Ammonia
 Liqueur Ammoniae Acetas
 Spirits Ammoniae Aromatic
 Acid Sulphuric
 Sulphur

上同	酒片鴉臭無
九十六	啡麼
十七	鹽啡麼
上同	養三磺啡麼
一十七	綠輕啡麼
上同	鹽醋啡麼
二十七	養三磺亞底高
三十七	硃囉哥
上同	酒打伊味加
四十七	冰養綠
五十七	冰頓奴枯
上同	溴鈦甲
七十七	論藥病改
八十七	加利蛤有內水山
上同	類鹽有內水山
上同	淡輕四
上同	養二炭淡輕四
上同	鹽松甘淡輕四
九十七	養三磷淡輕四
上同	水淡輕四
一十八	水醋淡輕四
上同	酒香淡輕乙
上同	酸養二磺
上同	磺硫

Sulphur Springs

ALTERATIVES,

Iodine

Iodide of Potassium

Arsenic

Fowler's Solution

Donovan's Solution

Potassa Chlorate

Ammonium Chloride

Cod Liver Oil

Sarsaparilla

Mercury

Pilulae Hydrarg (Blue Mass)

Calomel

Red Iodide of Mercury ...

Green Iodide of Mercury ...

White Precipitate

Sulphide of Mercury

Red Precipitate ...

Ointment of Red Precipitate ...

Ointment Nitrate of Mercury ...

Ung. Hydrarg. Mitis

VOLUME 4.

Sedatives - Arterial and Nervous...

上同	味礪硫有內水山
二十八	藥病改乙
上同	質礪
六十八	礪銀
七十八	石信
九十八	水石信
上同	水汞石信
十九	養三綠銀
一十九	綠淡輕四
三十九	油肝魚
五十九	列把沙沙
六十九	銀水
七十九	丸藍汞
八十九	米路迦綠汞
上同	礪汞紅
九十九	礪汞青
上同	綠汞淡輕四
上同	礪汞
百一	散養汞紅
上同	膏養汞紅
一百零一	膏苗汞
上同	膏藍汞
四卷	
篇一	論平脈平

Of Motor Functions of Cord and Sympathetic

Conium (Hemlock)
Gelsemium
Arnica
Tremithylamine
Jaborandi
Physostigma (Calabar Bean)
Eserine
Tobacco
Lobelia
Acid Hydrocyanic
Potass. Cyanide
Of Nerves
Amyl Nitrite
Aconite
Veratrum Album (white hellebore)
Veratrum Viride (Amer. hellebore)
Ice Water
Cold Water
Acid Citric

ANTISEPTICS.

Oxygen
Ozone
Chlorine

二	筋腦和自及髓脊平甲
上同	落謙
上同	咪司遮莉末洋
上同	加匿亞
三	連搭微帶
四	的蘭波乍
上同	葦巴喇加
上同	連司亞
上同	葉菸
六	利卑路
上同	酸淡炭輕
上同	淡炭鈦
七	筋氣腦平乙
上同	養三淡咧味亞
上同	頭烏草
九	稔罇匪白蘆藜白
十	蘆藜青
一十	水冰
上同	水冷
二十	酸檸
三十	論生物微毒細殺解
四十	氣養
上同	純阿
五十	氣紹

Bromino	六十
Acid Carbolic	上同
Creosote	九十
Acid Salicylic	十二
Soda Boras	十二
Acid Boracio.	三十二
Hydrarg-Bichlor (Cor. Sub.)	上同
Benzoic Acid.	四十二
Oils Antiseptic	五十二
Ol. Caryophilli	上同
Ol. Gaultherii ...	上同
Ol. Thymi....	上同
Ol. Cajuputi	上同

COUNTERIRRITANTS.

Sinapis Alba and Nigra ...	六十二
Charta Sinapis	七十二
Emplastrum Arnica	上同
Emplastrum Picis Burg	八十二
Emplastrum Picis Canaden	上同
Emplastrum Picis O. Canth	上同
Ammonia	九十二
Liniment Camph.	十三
Liniment Saponis	上同
Liniment Terebinth	上同

六十	質溴
上同	酸匿播加
九十	蘇阿幾
十二	酸先泐沙
十二	養礪鎢砂礪
三十二	酸養礪
上同	藥毒綠汞
四十二	酸息安
五十二	類油毒解
上同	油香丁
上同	油釐碘交
上同	油芹苗
上同	油撥枝加
六十二	論 外 症 引
七十二	末芥白黑
上同	紙末芥
八十二	膏加匿亞
上同	膏地根把
上同	膏香松
九十二	膏蜚斑和地根把
十三	水淡輕三
上同	酒藥腦樟
上同	酒藥鹼番
一十三	酒藥油節松

Capsicum	上同	椒辣
B. Epispastics	二十三	法之火水
Croton Oil	三十三	油荳巴
Ceratum Canth	上同	膏蝨斑
Charta Canth.	四十三	紙蝨斑
Tinc. Canth	上同	酒蝨斑
O. Escharoites	上同	法之烙鐵
Liquor Potassa	上同	水養鉞
Caustic Potassa	五十三	丹養鉞
Chromic Acid	六十三	酸養三鎔
Silver Nitrate	上同	養三淡銀
Acid Nitric	七十三	酸強硝酸養三淡
Acid Nit. of Mercury	上同	丹養三淡汞
Zinc Chloride	上同	丹綠鐸
Alum. dried	九十三	礬白
Zinc Sulphate	上同	養四礬鐸
Copper Sulphate	上同	養四礬銅
Heat	上同	氣火
EMOLLIENTS.						論去毒皮腫消
Glycerine	一十四	油甘
Vaseline	上同	玲士花
Collodion	二十四	酒綿火
Gum Acacia	上同	末膠樹
Linseed.	三十四	子麻胡

Poultices	四十四	消腫潤皮方
Ulmus	上同	榆皮
Pau fa	上同	刨花
Recipes for foul discharges	上同	腐瘡奸吵二方
Vegetable Poultices	五十四	山草藥類
ANTACIDS.		論劑之 ^{解酸}
Lime	七十四	石灰
Chalk	八十四	淨火石粉
Liquor Potassa	九十四	二銖養水
Potassa Bi-Carb	上同	二銖雙炭養
Magnesia	上同	銖養
Soda Carb	十五	二銖炭養
Soda Bi-Carb	一十五	蘇打
Argillaceous Earth.	三十五	滑石
ANAESTHETICS.		蒙藥論
Ether	五十五	伊打酒
Chloroform	六十五	嗎囉方
Nitrous Oxide Gas	七十五	二淡三養氣
Cocoea	八十五	高告
MISSELLANEOUS.		雜述
Zinc Valerianate	上同	廿松錐珠
Musk	上同	麝香
Savin	上同	西墳
Potassa Nitras	十六	火硝

potassa per-manganate.
Calcium Chloride
Emplastrum Hydrarg
Black Wash
Yellow Wash
Soda Sulphate
Litharge
Emplastrum Adhesive
Basilicon Ointment
Plaster of Paris
Urea as medicine (Chi)
Asbestos Tremolite (Hornblende)
Lithomarge
Liquid Amber

DIETETICS.

Chocolate
Pepsin (Pork)
Pepsin of Chicken
Pancreatic Juice
Hypophosphites
Phosphate of Lime and Soda
Diet in fever and inflammation
Diet in diseases of stomach and bowels	...
Diet in inflammation of stomach	...
and liver

上同	養八錳二鈹二
二十六	散綠鈹
上同	膏鉛汞
三十六	水鈹汞黑
上同	水鈹汞黃
上同	養三磺二鐵
上同	僧陀蜜
四十六	膏口合
上同	膏口收
上同	膏石
五十六	石秋
上同	石起陽
上同	脂石赤
四十八	子楓大
六十六	論製養調
八十六	辣高初
上同	汁內肚猪先啤
十七	汁嘍雞
上同	汁肉甜牛猪
上同	功用藥光等各製所質麟
三十七	用功燐鐵燐石
六十七	物之食應症熱症炎
八十七	物之食應症腸胃
九十七	忌宜物食炎膽症胃

Index

Diet in Dysentery.	十八	物之食應血便
Diet in Anaemia and debility	上同	物之食應弱身
Diet in Diabetes	上同	忌宜物食症消下
Nourishment by Injections	一十八	命度以門肛入物納
Diet in Skin Diseases	上同	物之食應症膚皮
Preparation of ointments, Tinctures, &c.	二十八	法之水藥酒藥膏藥
Belladonna Plaster	三十八	膏茄顛
Infusion of Liquorice	上同	水草甘

